

欽定四庫全書

子部
傷寒類方
目錄
上錄

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣裴謙覆勘

覆校官侍講臣張燾

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣趙興文



欽定四庫全書		子部五	
傷寒類方目錄		醫家類	
卷上			
桂枝湯類一		十九	
桂枝湯			
桂枝加附子湯			
桂枝加桂湯			
桂枝去芍藥湯			
欽定四庫全書		傷寒類方	
桂枝去芍藥加附子湯			
桂枝加厚朴杏仁湯			
小建中湯			
桂枝加芍藥生薑人參新加湯			
桂枝甘草湯			
茯苓桂枝甘草大棗湯			
桂枝麻黃各半湯			
桂枝二麻黃一湯			



桂枝二越婢一湯	桂枝去桂加茯苓白朮湯	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	桂枝加葛根湯	桂枝加芍藥湯	桂枝加大黃湯	麻黃湯類二方	欽定四庫全書 傷寒類方	麻黃湯	麻黃杏仁甘草石膏湯	大青龍湯	小青龍湯	麻黃附子細辛湯	麻黃附子甘草湯	葛根湯類三方	葛根湯
---------	------------	-----------------	-----------	--------	--------	--------	--------	----------------	-----	-----------	------	------	---------	---------	--------	-----



葛根黃芩黃連湯	葛根加半夏湯	柴胡湯類四 _{方六}	小柴胡湯	大柴胡湯	柴胡加桂枝湯	柴胡加龍骨牡蠣湯	柴胡桂枝乾薑湯	欽定四庫全書 傷寒類方	柴胡加芒硝湯	梔子湯類五 _{方七}	梔子豉湯	梔子甘草豉湯	梔子生薑豉湯	梔子乾薑湯	梔子厚朴枳實湯	梔子槩皮湯
---------	--------	---------------------	------	------	--------	----------	---------	----------------	--------	---------------------	------	--------	--------	-------	---------	-------



枳實梔子豉湯	卷下	承氣湯類六方十二	大承氣湯	小承氣湯	調胃承氣湯	桃仁承氣湯	抵當湯	欽定四庫全書 傷寒類方	抵當丸	十棗湯	大陷胸湯	大陷胸丸	小陷胸湯	白散	麻仁丸	瀉心湯類七方十一
--------	----	----------	------	------	-------	-------	-----	----------------	-----	-----	------	------	------	----	-----	----------



五苓湯類九 方四	竹葉石羔湯	白虎加人參湯	白虎湯	白虎湯類八 方三	厚朴生薑甘草半夏人參湯	旋復代赭石湯	乾薑黃連黃芩人參湯	欽定四庫全書 傷寒類方	黃芩加半夏生薑湯	黃芩湯	黃連湯	附子瀉心湯	大黃黃連瀉心湯	半夏瀉心湯	甘草瀉心湯	生薑瀉心湯
----------------------------	-------	--------	-----	----------------------------	-------------	--------	-----------	----------------	----------	-----	-----	-------	---------	-------	-------	-------



五苓散	猪苓湯	文蛤散	茯苓甘草湯	四逆湯類十一方	四逆湯	四逆加人參湯	通脈四逆湯	欽定四庫全書 傷寒類方	通脈四逆加猪胆汁湯	乾薑附子湯	茯苓四逆湯	白通湯	白通加猪胆汁湯	四逆散	當歸四逆湯	當歸四逆加吳茱萸生薑湯
-----	-----	-----	-------	---------	-----	--------	-------	----------------	-----------	-------	-------	-----	---------	-----	-------	-------------



理中湯類十一方九	理中丸	真武湯	附子湯	甘草附子湯	桂枝附子湯	桂枝附子去桂加白朮湯	茯苓桂枝白朮甘草湯	欽定四庫全書 傷寒類方	芍藥甘草附子湯	桂枝人參湯	雜方十二方廿二	赤石脂禹餘糧湯	炙甘草湯	甘草乾薑湯	芍藥甘草湯	茵陳蒿湯
----------	-----	-----	-----	-------	-------	------------	-----------	----------------	---------	-------	---------	---------	------	-------	-------	------



麻黃連軹赤小豆湯	瓜蒂散	麻黃升麻湯	黃連阿膠湯	吳茱萸湯	半夏散及湯	桃花湯	豬膚湯	欽定四庫全書 傷寒類方	甘草湯	桔梗湯	苦酒湯	烏梅丸	白頭翁湯	牡蠣澤瀉散	蜜煎導方	豬胆汁方
----------	-----	-------	-------	------	-------	-----	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	------



燒裨散

以上共一百十三方

臣等謹案傷寒類方二卷

國朝徐大椿撰大椿字靈胎吳江人後漢張機

傷寒論乃晉王叔和蒐採成書本非機所自

定金聊城成無已始為作註又以己意移易

篇章自後醫家屢有刊正動以錯簡為詞如

治尚書者之爭洪範武成註大學者之爭古

欽定四庫全書

傷寒類方

本今本迄於有明終無定論大椿以為非機

依經立方之書乃救悞之書當時隨症立方

本無定序於是削除陰陽六經門目但使方

以類從症隨方証使人可按症以求方而不

必循經以求症雖於古人著書本意未必果

符而於聚訟紛呶之中亦芟除葛藤之一術

也其中辨証發明亦多精到凡分一十二類

計方一百一十有三末附六經脈注又論正



症之外有別証變症附以刺法皆有源委可	尋自謂七年之中五易草藁乃成云乾隆四	十二年三月恭校上	總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅	總校官 臣 陸費墀	欽定四庫全書	傷寒類方
-------------------	-------------------	----------	---	--------------------------	--------	------



傷寒類方原序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其証候診脈聲
色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃
叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多
陰經治法陰經中多陽經治法參錯不一後人各生議
論每成一書必前後更易數條互相訾議各是其說愈
更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書乃
救誤之書也其自序云傷天橫之莫救所以尋求古訓

欽定四庫全書

傷寒類方

博採衆方蓋因誤治之後變症錯雜必無循經現症之
理當時著書亦不過隨症立方本無一定之次序也余
始亦疑其有錯亂乃探求三十年而後悟其所以然之
故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷
無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽
此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理
解肌發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其
加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十



傷寒類方



欽定四庫全書

傷寒類方卷上

吳江徐大椿撰

桂枝湯類一

桂枝湯

桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚
去皮

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力桂枝本不

欽定四庫全書

傷寒類方

能發汗故須助以熱粥內經云穀入於胃以傳於肺肺主皮毛汗所從出歠粥充胃氣以達於肺也觀此

可知傷寒溫覆令一時許遍身絳絳微似有汗者益

佳不可令如水流漓病不必除此解肌之法也若如水

邪仍若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更

服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡

若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病証猶

在者更作服若汗不出乃服至二三劑桂枝湯全料謂之一劑三

分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服不過五錢零矣治傷寒大



症分兩不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見服藥得效者反令多服無效者即疑藥誤又復易方無往不誤矣

禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪及

臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱

風在外故陽脈浮衛氣有邪則不能護營故陰脈弱陽浮

者熱自發

風為陽邪故發熱桂枝之辛以散之

陰弱者汗自出

芍藥之酸以收之甘

草之甘以緩之

嗇嗇惡寒淅淅惡風

惡風未有不惡寒者但惡寒甚輕非若中寒及陰經

之甚也

翕翕發熱

其熱亦不如陽明之甚

鼻鳴乾嘔者

鼻鳴似屬陽明乾嘔似屬

少陽蓋三陽相近故畧有兼病但不甚耳

桂枝湯主之

欽定四庫全書

傷寒類方

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此桂枝湯總症

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法

治誤

若不上衝者不可與之

此誤下之症誤下而仍上衝則邪氣猶在陽分故仍用桂枝發

表若不上衝則其邪已下陷變病不一當隨宜施治論中誤治諸法詳觀自明

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與

桂枝湯則愈

此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太

甚不僅在衛而在經刺之以洩經氣風府一穴在項上入髮際一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會刺入四

分留三呼風池二穴在顙額後髮際陷者中足少陽陽維之會針入三分留三呼



太陽病外症未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯 脈症屬太陽仍不離桂枝法 病雖過期	太陽病外症未解者不可下也 此禁下總訣 下之為逆欲解	外者宜服 言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外而後下也	太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外	而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈	宜服 脈浮而下此為誤下下後仍浮則邪不因誤下而陷入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也	病嘗自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣	欽定四庫全書 傷寒類方	不共榮氣和諧故爾 榮氣和者言榮氣不病非調和之和故又由言之 以營行	脈中衛行脈外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯 自汗與發汗迥別自汗乃營衛相離發汗使營衛相合自汗傷正發汗驅邪復發者因其自汗而更發之則榮衛和而自汗反止矣	病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和	也先其時 未熱之時 發汗則愈宜桂枝湯主之 無他病太陽諸症不必備	而惟發熱自汗故亦用桂枝湯	傷寒不大便六七日 宜下之候 頭痛有熱者未可與承氣湯
---	---	--	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	--	--	---	------------------------------	---	------------------------------------	---



太陽症仍在不得以日久不便而下也按其小便清	者知不在裡仍在表也便赤為當須發汗若頭痛者必	衄汗出而頭痛未解則宜桂枝湯	傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗發汗未	乃服藥不及之故宜桂枝湯	傷寒醫下之續得下痢清穀不止症裡身疼痛者表急當	救裡此誤下之症邪在外而引之入陰故便清穀陽氣	可下下脫可危雖表症未除而救裡為急傷寒論不	便清穀熱多者便膿血後身疼痛清便自調者急當救	欽定四庫全書傷寒類方	表清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後	分治而序不亂後人欲以救裡宜四逆湯救表宜桂枝	湯	太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪	風者宜桂枝湯提出邪風二字見	陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此	方陽明本自多汗但不惡寒而惡熱今多汗而猶	太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯太陰本無汗法因其
--	---	-------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	--	---	----------------------------------	---	---	----------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	---



故亦用桂枝從 脈不從症也	病人煩熱汗出則解又加瘧狀有時日晡所發熱者屬	陽明也日晡發熱則為陽明脈實者宜下之脈虛浮者	宜發汗一症而治法迥別全以脈為下之與大承氣湯	發汗宜桂枝湯	下痢腹脹滿症裡身疼痛者表先溫其裡乃攻其表溫裡	宜四逆湯攻表宜桂枝湯此節屬厥陰症未必由誤治而得然既見表症亦宜兼治	吐痢止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小	欽定四庫全書 傷寒類方	和之裡症除而表症猶在仍宜用桂枝法輕其劑而加減之可也	傷寒大下後復發汗再心下痞邪入惡寒者表未解也	不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻	痞宜大黃黃連瀉心湯苦寒開降之法詳見後	桂枝加附子湯二	桂枝湯原方加附子一枚炮去皮破八片右六味以水七升煮	取三升去查溫服一升	太陽病發汗遂漏不止此發汗太過如水瀉或藥不對症之故其人惡風
-------------------------	---	---	---	---------------	---	--	------------------------------	------------------------	---	--	------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	--



中風本惡風汗後當愈今 仍惡風則表邪未盡也 小便難少津液 四肢微急難以	屈伸 四肢為諸陽之本急難屈伸乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮	當用四 逆湯矣桂枝加附子湯主之 桂枝同附子服則能止汗回陽	桂枝加桂湯 三桂枝原方加桂二兩即另立湯名治症迥別古聖立方之嚴如此	桂枝湯原方加桂 二兩 右五味以水七升煮取三升	去滓溫服一升	燒針令其汗針處被寒 復感新寒 核起而赤者必發奔豚氣	從小腹上衝心者灸其核上各一壯 不止一針故云各一壯 與桂	欽定四庫全書 傷寒類方	枝加桂湯 重加桂枝不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚症此方可增減用之	桂枝去芍藥湯 四	桂枝湯原方去芍藥右四味以水七升煮取三升溫	服一升	桂枝去芍藥加附子湯 五	即前方加附子 一枚炮去皮破八片 餘依前法	太陽病下之後脈促胸滿者 中虛而表邪仍在 桂枝去芍藥湯	主之 太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥 若微惡寒者去芍藥方
---	--	--	---	--	---------------	---	---	--	---	-------------------------------------	-----------------------------	------------	--	--	--	---



中加附子湯主之微惡寒則陽亦虛矣故加附子	桂枝加厚朴杏仁湯六	桂枝湯原方加厚朴二兩炙杏仁五十枚右七味以水	七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗	喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣本經杏仁主咳逆上氣	太陽病下之微喘者表未解故也此湯主之前條乃本然之喘此	乃誤下之喘因殊而法一	小建中湯七	欽定四庫全書 傷寒類方	桂枝湯原方加膠飴一升右六味以水七升煮取三	升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家	不可用建中湯以甜故也	傷寒陽脈濇陰脈弦中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濇而陰弦也法當腹中	急痛先與小建中湯膠飴大甘以助中宮不差者與小柴胡湯主	之治太陰不愈變而治少陽所以疎土中之木也以脈弦故用此法	傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛煩可	知故用建中湯以補心脾之氣蓋梔子湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也
---	---------------------------------	--	--------------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------	-------------------	--	---	--	---	--



桂枝加芍藥生薑人參新加湯 八	桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六	味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升 此以多煎為妙	取其味厚入陰也	發汗後身疼痛 表未盡 脈沈遲 氣虛已甚 此湯主之 邪未盡宜表而氣虛	不能勝散藥故用人參凡素體虛而過汗者方可用	桂枝甘草湯 九	桂枝 四兩 甘草 二兩 右二味以水三升煮取一升頓	欽定四庫全書 傷寒類方	服 此以一劑為一服者	發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯主	之 發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲擗地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣	茯苓桂枝甘草大棗湯 十	茯苓 半斤 桂枝 四兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 右四味以	甘爛水一斗 以水二斗揚之萬遍取用按甘 先煮	茯苓 凡方中專重之 減二升內諸藥煮取三升去渣	藥法必先煮
--------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--	--------------



溫服一升日三服	發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之	陽臍下悸則因發汗太過上焦乾涸腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚	桂枝麻黃各半湯	桂枝一兩十六銖去皮芍藥生薑甘草炙麻黃	去節各一兩大棗四枚杏仁二十四枚去皮及雙仁者右七味以水五	升先煮麻黃一二沸去上沫欲去沫故先煮內諸藥煮取一	升八合減去三之一去滓溫服六合一云桂枝湯三合麻	欽定四庫全書	黃湯三合頓服將息如上法	太陽病得之八九日經過如瘧狀發熱惡寒熱多寒少已邪	漸輕其人不嘔非少陽清便欲自可無裡熱一日二三度發非瘧	象脈微緩者不浮不弦不大為欲愈也餘邪欲退之象脈微而惡寒者	此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也此三句申明上文欲愈之故蓋	由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增	醫者不審面色反有熱色者未欲解也面有熱色則誤人多矣	其不得小汗出身必痒宜服微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其
----------------	--------------------------	---	----------------	---	---	---	--	---------------	--------------------	--	--	---	---	--	---	---



小汗足矣陽明篇云身痒如蟲行皮中狀者此以久虛故也按此方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分三服祇服四錢零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也		桂枝二麻黃一湯 十二		桂枝 一兩十七銖去皮 芍藥 一兩六銖 甘草 一兩二銖 杏仁 十六枚去皮尖 麻黃 十六銖去節 生薑 一兩六銖 大棗 五枚		右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升合為三升分再服		欽定四庫全書 傷寒類方		服桂枝湯大汗出脈洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法此所謂邪不盡行復如法者也若形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻黃一湯主之此與桂枝麻黃各半湯意畧同但此因大汗出之後故桂枝畧重而麻黃		輕畧		桂枝二越婢一湯 十三		桂枝湯加麻黃石羔二味		桂枝 去皮 芍藥 甘草 麻黃 去節各十八銖 大棗 四枚 生薑 二兩 石羔 二十四銖碎綿裹 右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去渣溫服一升	
---	--	-------------------	--	---	--	--	--	--------------------	--	--	--	-----------	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--



附越婢方	麻黃六兩	甘草二兩	石膏半觔
生薑三兩	大棗十五枚		
太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可			
更汗	此無陽與亡陽不同并與他處之陽虛亦別蓋其		
人本非壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱而脈微弱			
若發其汗必至有又手冒心臍下悸等症故以此湯清			
疎營衛令得似汗而解况熱多寒少熱在氣分尤與石			
羔為宜古聖用藥之審如此按以上三方所謂一二			
各半之說照方計算並不對準未知何說或云將本方			
各煎或一分或二分相和服此亦一法			
但方中又各藥注明分兩則何也存考			
桂枝去桂加茯苓白朮湯	十四		
芍藥	三兩	甘草	二兩
生薑		茯苓	
白朮	各三兩		
欽定四庫全書			
傷寒類方			
大棗	十二枚	右六味以水八升煮取三升去滓溫服一	
升小便利則愈	此方專於利小便		
服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿			
微痛小便不利者此湯主之	頭痛發熱桂枝症仍在也		
枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津			
液而有停飲者也凡方中有加減法皆佐使之藥若			
去其君藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所			
不可解殆以此方雖去桂枝而意仍不離乎桂枝也			
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯	十五		
桂枝湯原方去芍藥加蜀漆	三兩洗	牡蠣	五兩
龍骨			



四兩 右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸	藥煮取三升去滓溫服一升	傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其胸中之陽起卧	不安者此湯主之此與少陰汗出之亡陽迥別蓋少陰之亡陽乃亡陰中之陽故用四逆輩	回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安	神之品鎮其陽於心中各有至理不可易也去芍藥	因陽虛不復助陰也蜀漆去心	腹邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣	桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六	桂枝一兩甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩右四味以	欽定四庫全書傷寒類方	水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服	脈浮宜以汗解此治脈浮之總訣用火灸之誤邪無從出因火	而盛火反入內病從腰以下必重而痺名火逆也火氣在上則陰氣獨	治於下故重而痺	火逆下之又誤因燒針煩燥者更誤治下之虛其陰燒	煩燥不寧矣桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之鎮其陰氣散其火	驚狂治重在心故用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同	桂枝加葛根湯十七此湯成無已本有麻黃非
----------------------------------	--------------------	---	---	------------------------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------	--	--	---	--



桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同	右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內諸藥	煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥	太陽病項背強几几反汗出惡風者 凡几伸頸之象邪氣漸深故加葛根	桂枝加葛根湯主之	桂枝加芍藥湯 十八	桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水七升煮取三	升溫服一升日三服	欽定四庫全書 傷寒類方	桂枝加大黃湯 十九 此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝	桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七	升煮取三升去滓溫服一升日三服	本太陽病醫反下之 誤治 因而腹滿時痛屬太陰也 引邪入於	太陰故所現 皆太陰之症 桂枝加芍藥湯主之 雖見太陰症而太陽之症尚未罷故仍用	桂枝湯只加芍藥一倍以斂太陰之症	大實痛者 此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過傷太陰之氣大實痛則邪氣結於太陰矣桂	枝加大黃湯主之 此因誤下而見太陰之症大實痛則反成太陰之實邪仍用大黃引之即
----------------------	----------------------	---------------------	--	----------	--------------------------	----------------------	----------	----------------------------	--	----------------------	----------------	---	---	-----------------	---	---



從太陰出不因誤下而禁下見症施治無不應驗江淮按 活人書云桂枝湯自西北人四時行之無不應驗江淮按 間惟冬及春可行之春末及夏至以前桂枝症可加黃 芩一分謂之陽旦湯夏至後可加知母半兩石羔一兩 或加升麻一分若病人 素虛寒者不必加減	麻黃湯類二	麻黃湯 一	麻黃 三兩 桂枝 二兩 甘草 一兩 杏仁 七十個 右四味	以水九升先煮麻黃減二升 此須多煮取其力專不 僅為去上沫止煮一二	沸 去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取 矣	欽定四庫全書 傷寒類方	微似汗不須啜粥 以其易 餘如桂枝將息法 活人書 後用麻黃湯量加知母石羔黃芩 云夏至	蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之意	太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛 此痛處比桂枝 榮衛俱 傷故也 惡風無汗而喘者 此二症乃肺氣不舒之故麻 黃治無汗杏仁治喘桂枝甘	草治太陽諸症無一味 不緊切所以謂之經方	太陽與陽明合病 陽明之病象甚多如身熱不惡寒口 苦鼻乾之類但見一二症即是不必	全具也太陽病 喘而胸滿者不可下 病俱在 宜麻黃湯	即上文所指者 喘而胸滿此麻黃症	主之 喘而胸滿此麻黃症	之太陽合陽明也
--	--------------	--------------	-------------------------------------	---	---	--------------------	---	----------------------	---	----------------------------	---	---------------------------------	------------------------	--------------------	----------------



太陽病十日以去經過脈浮細邪已而嗜卧者正漸外已 解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯邪胸滿脇痛病延日久 脈但浮者與麻黃湯若果邪在少陽矣故仍用麻黃湯此 亦從脈不從症之法	太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的八 九日不解表証仍在表証即上此當發其汗宜麻服藥	已微除其人發煩目瞑陽鬱而不劇者必衄衄乃解熱 動血血由肺之清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不	欽定四庫全書 傷寒類方	欲嘔者此必衄所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為 寒之類也麻黃湯主之此言未衄之前可用麻	脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮必帶緊	脈浮而數者可發汗宜麻黃湯數為陽	傷寒脈浮緊不發汗治失因致衄者麻黃湯主之前段衄	則不必復用麻黃湯後	尚未解則仍用此湯	陽明病脈浮無汗而喘者陽明本脈大自汗今乃脈浮	發汗則愈宜麻黃湯
---	--	--	---------------------------	---	---	---------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------	---	-----------------



麻黃杏仁甘草石羔湯 二 此即越婢湯加杏仁也	麻黃 四兩 杏仁 五十個 甘草 二兩 石膏 半斤 右四	味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取	二升去滓溫服一升	發汗後不可更行桂枝湯 既汗不可再汗 汗出而喘 尚有	留邪在肺故 無大熱者 邪已 可與此湯 汗出故用石膏	發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘 此二句明致喘之所由蓋喘未	必皆由於水而飲水則無有不喘者戒之	欽定四庫全書 傷寒類方	下後不可更行桂枝湯 既下不可復汗 若汗出而喘無	大熱者可與此湯	大青龍湯 三 此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥	麻黃 六兩 桂枝 二兩 甘草 二兩 杏仁 四十枚 生薑 三	切 大棗 十二枚 石膏 碎如雞子 右七味以水九升先煮	麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一	升取微似汗汗出多者溫粉撲之 此外治之法論中無溫粉方明理論
--	--	-----------------------------	-----------------	--	---	--	--	-----------------------------------	---	----------------	---	---	--	-----------------------------	--



服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩燥不得眠也	太陽中風脈浮緊 緊為陰脈故 發熱惡寒 非惡風 身疼痛	不汗出而煩燥者 邪深熱鬱 大青龍湯主之若脈微弱汗出	惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也 惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象矣立此方即垂	此戒聖人之意深矣 按此方合麻桂而用石羔何以	發汗如是之烈蓋麻黃湯麻黃用二兩而此用六兩越	婢湯石羔用半斤而此用鷄子大一塊一劑之藥除大	棗約共十六兩以今稱計之亦重三兩有餘則發汗之	重劑矣雖少加石羔終不足以相制也 少陰篇云脈	陰陽俱緊反汗	出者亡陽也	欽定四庫全書	傷寒類方	傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青	龍湯主之 脈不沉緊身有輕時為無少陰陰俱在外也故以	大青龍發其汗 按此條必有誤脈浮緩邪輕易散身	不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症	此病之最輕者何必投以青龍險峻之劑	此必另有主方而誤以大青龍當之者也	小青龍湯 四	麻黃 去節 芍藥 細辛 乾薑 甘草	桂枝 去皮各 五味子 半斤 半夏 湯洗 右八味以水一	斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓
----------------------	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------	-------	--------	------	-----------------------	---	--------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------	--	---	----------------------



溫服一升

若微利者去麻黃加薏花如鷄子大熬令赤色

利屬下焦

陰分不可更發其陽薏花明理論作薏花恐誤本草薏花薏花葉相近而薏花不常用當時已不可得

故改用薏花以其若渴者去半夏加括婁根三兩

皆去水之功也括婁根主消渴若噎者噎古作餉論云寒氣相搏則為腸鳴

得寒氣冷必相搏其人即餉按去麻黃加附子一

枚炮本草附子溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四

兩小便不利而少腹滿則水不在上而在下矣故用茯苓若喘者去麻黃加杏

欽定四庫全書

傷寒類方

仁半升去皮尖

杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源邪汗未盡必停於

肺胃之間病屬有形非一味發散所能除此方無微不至真神劑也

傷寒表不解發汗未透心下有水氣即未出之汗乾嘔發熱而欬

或渴或痢或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯

主之以上皆水停心下現症其每症治法皆在加減中

傷寒心下水氣欬而微喘發熱不渴凡水停心下者喘而不渴服

湯已即小青龍湯也渴者此寒氣欲解也寒飲欲去小青龍湯主之

此倒筆法即指服湯已三字非謂欲解之後更服小青龍湯也



麻黃附子細辛湯 五	麻黃 去節 二兩 細辛 二兩 附子 一枚 右三味先煮麻黃減	二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服	少陰病始得之反發熱脈沉者此湯主之 少陰病三字所該者廣必	從少陰諸現症細細詳審然後反發熱知為少陰之發熱否則何以知其非太陽陽明之發熱耶又必候其脈象之沉然後益知其為少陰無疑也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫經之藥夫人知之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通用亦能溫裡故陰經	欽定四庫全書 傷寒類方	諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少陰始入之邪非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣	麻黃附子甘草湯 六	麻黃 去節 二兩 甘草 二兩 附子 一枚 右三味以水七升先	煮麻黃一兩沸 此當 去上沫內諸藥煮取三升去渣	溫服一升日三服	少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三	日無裡症故微發汗也 三陰經惟少陰與太陽為表裏而位最近故猶有汗解之理況	二三日而無裡症則其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也
---------------------------------	---	------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---------------------------------	---	--	----------------	------------------------------	--	--



葛根湯類三	葛根湯 一 此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩	葛根 四兩 麻黃 三兩 芍藥 二兩 生薑 三兩 甘草 二兩	桂枝 二兩 去皮 大棗 十二枚 右七味以水一斗先煮麻黃葛	根 二味主 減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫	服一升覆取微似汗不須啜粥 已能發 餘如桂枝法	將息及禁忌	太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之 前桂枝加	欽定四庫全書 傷寒類方	條其現症亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故	全入陽明之症以太陽病按葛根本草治身大熱大	熱乃陽明之症也以太陽將入陽明之經故加此藥	太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之 合病全在	上審出蓋風邪入胃則下利矣	葛根黃芩黃連湯 二 半斤 甘草 二兩 黃芩 三兩 黃連 三兩 右四味以	水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去渣分 溫再服
--------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------	--	---------------------------------



太陽病桂枝症桂枝症即太陽傷風之正病也醫反下之大利遂不止 邪下陷則脈促者表未解也促有數意邪猶在外尚未利無止時 故不用理喘而汗出者此湯主之因表未解故用葛根中等法 連之苦以洩之堅之 芩 連甘草為治痢之主藥	葛根加半夏湯 三	葛根湯原方加半夏半升洗煎服法同	太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何	從而知必須從兩經本症一一對勘即不下利而亦可定為合病矣但嘔者葛根加半夏	欽定四庫全書 傷寒類方	湯主之前條太陽誤下而成利則用芩連治利因其本屬桂枝症而脈促故止加葛根一味以解陽明 初入之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病立方各有法度	柴胡湯類四	小柴胡湯 一	柴胡 半斤 黃芩 半斤 人參 甘草 炙 生薑 各三兩	半夏 半斤 大棗 十二枚 右七味以水一斗二升煮取六	升去渣再煎此又取三升溫服一升日三服此湯除大棗共	劑蓋少陽介於兩陽之間須兼顧三經故藥不宜輕
---	--------------------------------	------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--------------	------------------------------	---	--	--	-----------------------------



干土心煩喜嘔 木邪上逆 或胸中煩而不嘔或渴 少陽火邪 或腹	寒往來者寒已而 熱已而寒也 胸脇苦滿 胸脇為少 默默不欲飲食	傷寒五六日 正當傳少 中風往來寒熱 太陽之寒熱時亦	變化心生矣 論中凡可用之方必有減法	小柴胡與桂枝二方用處極多能深求其義則 又按	五味收斂風火痰涎深入肺藏永難救療矣 乃獨用	勞怯火喘與此處寒飲犯肺之症又大不同 乃獨用	無單用五味乾薑必同用一以散寒邪一以斂正氣從 治嗽	嗽非宜生薑 去生薑故 加五味子半升乾薑二兩 方古	二味與 加乾薑故 加五味子半升乾薑二兩 方古	兩 微熱則邪 溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗	欽定四庫全書 傷寒類方	便 若不渴外有微熱者去人參 不渴則津液自足 加桂枝三	脇下 若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩 小利	除腹 若脇下痞鞭去大棗 補脾胃 加牡蠣四兩 別錄云治	婁根四兩 治消渴 若腹中痛者去黃芩 苦 加芍藥三兩	半夏 即能耗津液 加人參 生津 合前成四兩半括	不可用 加括婁實一枚 括婁實除胸痺此 若渴者去	煎法俱 若胸中煩而不嘔者去半夏人參 不嘔不必	去滓再煎者此方乃和解之劑再煎則藥性和合能 使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其
--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---



中痛土 木 尅或脇下痞鞭木 氣 填 鬱或心下悸有 痰 飲小便不利	或不渴有 蓄 飲身有微熱太 陽 未 盡或欬者肺 有 留 飲此湯主之少 陽	所現之症甚多柴胡湯所治之症亦不一加減法具載方末	血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正	邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連	其痛必下邪高痛下故使嘔也此條由明所以往來寒熱及不欲食下痛上嘔	之故皆因正衰邪入藏府相牽所致則立方之意可推而知矣小柴胡湯主之	服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之此必先見少陽之症故用柴胡	欽定四庫全書 傷寒類方	湯服後而渴則轉屬陽明矣	傷寒四五日身熱惡風頸項強此是太陽所同脇下滿此則少陽所獨	手足溫而渴者前條之渴者屬陽明此因脇下滿則雖似陽明不作陽明治矣小柴胡	湯主之	傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不	差者與小柴胡湯主之詳見桂枝類中	傷寒中風有柴胡症但見一証便是不必悉具少陽與太陽	明相為出入一証可據雖有他証可兼治矣
--	---	---	------------------------------	------------------------------	--	--	---	------------------------	-----------------------------------	--	---	------------	------------------------------	---------------------------------------	---	---



凡柴胡湯病証而下之治誤若柴胡証不罷者復與柴胡	湯凡誤治而本証未罷仍用本証必蒸蒸而振却發熱	汗出而解邪已陷下故必振動而後能達於外辨脈法	汗出邪仍從少陽而出	傷寒十三日不解過經胸脇滿而嘔此少陽日晡所發	潮熱此似陽明已而微利又現裡症藥此本柴胡症下之而	不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也以湯劑	應復以丸藥利之是謂重傷潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外雖	欽定四庫全書傷寒類方	熱本屬少陽之邪故仍以柴胡解外後以柴胡加芒硝主之解在後加	傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食	大便鞭脈細者此為陽微結陽氣不能隨經而散故營	致亦壞症之輕者必有表復有裡也以上諸症有表有裡脈沉	亦在裡也脈細者汗出為陽微以汗假令純陰結不得	復有外証陰則此為半在裡半在表也脈沉為裡脈雖	沉緊細即有不得為少陰病所以然者陰不得有汗此	訣要今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了
--	---	---	---------------------------------	--	--	---	---	----------------------------------	--	------------------------------	---	---	--	--	--	-------------------------------



者得屎而解得湯而不了者以有裡症故大便鞭必通其大便而後其病可愈其通便之法即加芒硝及大柴胡等方是也	陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱乃當下之症因大便小便自可則裡症未具又胸脇當滿則邪留少陽無	疑用此湯和解之	陽明病脇下鞭滿少陽不大便可而嘔亦少舌上白胎	者邪未結於陽明故舌胎白雖不大便不可下此要訣也可與小柴胡湯上焦得	通津液得下胃氣因和身濇然汗出而解也此四句由明小柴胡	欽定四庫全書傷寒類方	之功效如此所以諸症得之皆愈也按少陽之外為太陽裡為陽明而少陽居其間故少陽之症有兼太陽者有兼陽明者內中見少陽一症即可用小柴胡湯必能兩顧得效仲景所以獨重此方也	陽明中風脈弦浮大弦屬少陽浮大屬陽明而短氣腹都滿脇下	及心痛此少久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧此症又	一身面目悉黃小便難此二症又有潮熱此似耳前後	腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯	脈浮雖有裏症邪仍欲外出脈但浮無餘症者與麻黃湯但浮無餘症則裏症	全無必從汗解故用麻黃湯此二條明陽明中風之症有裏邪用小柴胡無裏邪則用麻黃總以脈症為憑
---	--	-------------------------------	---	---	---	----------------------------------	--	---	--	--	------------------------------	---	---



無一定	若不尿	勝胱	腹滿加噦者不治	論中陽明篇云
法也	攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也虛冷二字尤明	蓋陽微欲盡也又云大吐下汗出怫鬱復與之水以	發其汗因得噦靈樞云真邪相攻氣并相逆故為噦即	呃逆也素問云病深者其聲噦乃肺胃之氣隔絕所致
兼以腹滿	故不治	本太陽病不解轉入少陽者	此為傳經	脇下鞭滿乾嘔
不能食往來寒熱	以上皆少	尚未吐下脈沉緊者	未吐	經誤治也少陽已漸入裡故不浮
而沉緊則弦之甚者亦少陽本脈	與小柴胡湯	嘔而發熱者小柴胡湯主之	但發熱而非往來寒熱則	與太陽陽明同惟嘔則少
欽定四庫全書	傷寒類方	陽所獨故	亦用此湯	太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸滿
脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯	解見麻	傷寒差以後更發熱者小柴胡主之	此復症也非勞復	不充餘邪未盡留在半表半裏之間故亦用小柴
胡復病治法明著於此後世議論不一皆非正治脈浮	者以汗解之脈沉實者以下解之	復症之中更當考此	二脈如果脈見浮象	則邪留太陽當用汗法如脈見沉實則裏邪未盡當用
下法但汗下不著方名者因汗下之法不一醫者於麻	黃桂枝及承氣大柴胡等方對症	之輕重擇而用之則無不中病矣		



婦人中風七八日續得寒熱發作有時 此即下文所謂如瘧也	水適斷者此為熱入血室其血必結 血因熱結而成瘵矣 故使如	瘧狀發作有時小柴胡湯主之 即以治瘧之法治之	又云婦人中風發熱惡寒經水適來 彼云斷此云來 得之七八	日熱除而脈遲身涼 外邪內伏 胸脇下滿如結胸狀譫語者	此為熱入血室也 血室為中焦營氣之所聚肝藏血心主血營血結滯則肝氣與心經之氣	亦凝故脇滿 當刺期門隨其實而瀉之 期門在乳下第二肋端去乳頭	約四寸肝募也厥陰陰維之會刺入四分血結則為有形之症湯劑一時難效刺期門以瀉厥陰有餘之熱則	欽定四庫全書 傷寒類方	尤親切而易散	又云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如	見鬼狀者此為熱入血室 晝清而夜昏者血室屬陰病在陰經也 無犯胃	氣及上二焦必自愈 此為中焦營氣之疾汗下二法皆非所宜小柴胡湯刺期門則其治	也按熱入血室之狀此二條為最詳婦人傷寒此症最多前條症稍輕後二條症尤重男子亦有之	大柴胡湯 二小柴胡去人參甘草加枳實芍藥	柴胡 半斤 半夏 半斤 黃芩 三兩 芍藥 三兩 生薑 五兩 枳實 四枚 大棗 十二枚 右七味以水一斗二升煮取六
--	---	--	--	---	---	---	---	---------------------------	---------------	------------------------------	--	--	---	--	---



升再煎取三升溫服一升日三服		此方本有大黃二兩王叔和云若不大黃恐不為		大柴胡也		太陽病過經十餘日反二三下之 一誤 後二三日柴胡		症仍在者 如寒熱嘔逆之類 先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱		鬱微煩者 猶有裏症 為未解也與大柴胡湯下之則愈 前雖已下		非下法也以大柴胡兩解之		傷寒十餘日熱結在裏 此大黃之對症 復往來寒熱 此柴胡之對症 與		欽定四庫全書		傷寒類方		大柴胡湯		傷寒發熱汗出不解 當用柴胡 心中痞鞭嘔吐而下痢者 內邪		陷故用枳實半夏大黃 此湯主之		傷寒後 後者過經之後諸症漸輕而未全愈也 脈沉沉者內實也 沉為在裏 下		解之宜大柴胡湯		柴胡桂枝湯 三 此小柴胡與桂枝湯併為一方乃少陽太陽合病之方		柴胡 四兩 黃芩 二兩 人參 一兩 桂枝 二兩 芍藥 二兩		生薑 兩各一 半夏 二合 甘草 一兩 大棗 六枚 右九味水	
---------------	--	---------------------	--	------	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--	---	--	--------	--	------	--	------	--	---	--	-------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	---	--



七升煮取三升去渣溫服一升	傷寒六七日發熱微惡寒支節疼痛煩以上太陽症微嘔心下	支結以上少陽症外症未去者太陽症柴胡桂枝湯主之	發汗多亡陽譫語者此亡陽之輕者也不可下勿誤以為有燥屎之譫語故以	戒與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液後自愈桂枝湯和營衛	柴胡湯通津液深著二湯合用之功效而陽亡可復矣	柴胡加龍骨牡蠣湯四	柴胡 龍骨 生薑 人參 茯苓	欽定四庫全書 傷寒類方	鉛丹 黃芩 牡蠣 桂枝各一兩半半夏二合	大棗六枚 大黃二兩 右十二味以水八升煮取四升	內大黃更煮一二沸大黃只煮一二沸取其生而流利也去滓溫服一	升	傷寒八九日下之即陷入裡胸滿柴胡黃芩煩驚龍骨鉛丹小便不	利茯苓苓譫語大黃一身盡重不能轉側者茯苓此湯主之此乃正氣	虛耗邪已入裏而復外擾三陽故現症錯雜藥亦隨症施治真神化無方者也 按此方能下肝胆之驚痰以	癰之治癰 必效
---------------------	--	---	---	--	------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	--	---	---	----------	--	--	---	----------------



柴胡桂枝乾薑湯 五	柴胡 半斤 桂枝 三兩 黃芩 三兩 乾薑 牡蠣 熬	甘草 兩各二 括婁根 四兩 右七味以水一斗二升煮取	六升去渣再煎取三升温服一升日三服初服微煩	復服汗出便愈 邪氣已深一時不能即出如蒸	傷寒五六日已發汗而復下之 一誤 胸脇滿 用牡 微結	小便不利渴 以上皆少陽症 而不嘔 故去半 但頭汗出	陽氣上越 往來寒熱 用柴 心下煩者 黃芩 此為未解也	欽定四庫全書 傷寒類方	柴胡桂枝乾薑湯主之	柴胡加芒硝湯 六 柴胡湯原方加芒	柴胡 二兩十 黃芩 甘草 炙 人參 生薑 各	兩 半夏 二十 大棗 四枚 芒硝 二兩 右八味以水四升	煮取二升去渣內芒硝更煮微沸分溫再服不解更	作 不解不大便也 此藥劑之最輕者以今秤計之	加大黃枳實乃合用小承氣也此加芒硝乃	傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微
---------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	------------------	--	--	--	-----------------------------	---	---	------------------------------



利此本柴胡証下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之 本草芒硝治六府積聚因其利也潮熱而利則邪不停結故較之大柴胡症用藥稍輕	梔子湯類五	梔子豉湯 一	梔子 十四 香豉 四合 右二味以水四升先煮梔子得	二升半內豉煮取升半去滓分為二服溫進一服得	欽定四庫全書 傷寒類方	吐止後服 此劑分兩最小凡治上焦之藥皆然	發汗吐下後 諸法俱用未必皆誤而正氣已傷矣虛煩不得眠 虛為正氣	氣擾發汗吐下實邪雖去而其餘邪因正氣不充留於上焦故陽氣擾動而不得眠也 若劇者必	反覆顛倒心中懊懣 反覆顛倒身不得寧也 梔子豉湯	吐之 此非汗下之所能除者吐之而痰涎結氣無不出矣 按汗吐下之後而邪未盡則不在經而在肺	胃之間為有形之物故必吐而出之反覆顛倒心中懊懣懷摩寫病狀何等詳切凡醫者之於病人必事事體貼	如若身受之而後用藥無誤	發汗若下之而煩熱胸中窒者 煩熱且窒較前虛煩等象為稍實 梔子
--	--------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--------------------	--------------------------------------



豉湯主之	傷寒五六日大下之後治誤身熱不去心中結痛者未欲	解也外內之邪俱未解梔子豉湯主之按胸中窒結痛	胸蓋小陷胸症乃心下痛胸中在心之上故不得用陷	胸何以不用瀉心諸法蓋瀉心症乃心下痞痞為無形	痛為有象故不得用瀉心古人治病非但	內外不失厘毫即上下亦不踰分寸也	陽明病脈浮而緊咽燥口苦胸滿而喘發熱汗出不惡	寒反惡熱身重以上皆陽明本症若發汗則躁心憤憤	反譟語汗多若加燒針必怵惕煩燥不得眠即前以火	欽定四庫全書傷寒類方	驚狂若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣以前因	未必合度故病不舌上胎者此句乃要訣舌上有白胎	解各有現症如此梔子豉湯主之則胸中有物而可用吐法	否則邪尚未結	陽明病下之其外有熱表邪未盡手足溫不結胸無實心中	懊懣饑不能食痰涎停結但頭汗出陽邪在上梔子豉湯主	之	下利後更煩按之心下濡者濡者濕滯之象為虛煩也	宜梔子豉湯
-------------	--	--	---	---	--	---------------------------------------	------------------------------	---	--	----------------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	----------	---	--------------



梔子甘草豉湯 二	梔子湯原方加甘草二兩炙右三味以水四升先煮梔子甘草取二升半內豉煮取升半分二服溫進一服得吐便止	梔子生薑豉湯 三	梔子湯原方加生薑五兩先煮梔子生薑餘俱如前法得吐止後服	凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之 此服梔子湯之戒按梔	欽定四庫全書 傷寒類方	子清越上焦之火與腸胃亦無大害微瀉者即不可服未知何義想因大腸之氣滑脫者肺氣不宜更洩也	若少氣者梔子甘草豉湯主之 甘草能補中氣 若嘔者梔子生	薑豉湯主之 此二條言凡遇常用梔子湯之病見此二症則加此二味也按無物為嘔有物為	吐欲止其嘔反令其吐吐之而嘔反止真匪夷所思也	梔子乾薑湯 四	梔子 十四枚 乾薑 二兩 右二味以水三升半煮取一升	半去滓分二服溫進一服得吐止後服	傷寒醫以丸藥大下之 下未必誤以丸藥大下則誤矣 身熱不去 外有微邪
--------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	---	-------------------------------	--	------------------------	---



微煩下後而煩也此湯主之下後故用乾薑	梔子厚朴枳實湯五	梔子十四枚厚朴四兩枳實四枚水浸煮服法同前	傷寒下後心煩即微煩腹滿卧起不安者煩而加之腹滿則卧起俱不寧	矣厚朴枳實以治腹滿也梔子厚朴湯主之	梔子檣皮湯六	梔子十五枚甘草一兩黃檣二兩右三味以水四升煮	取升半去滓分溫再服	欽定四庫全書 傷寒類方	傷寒身黃發熱者梔子檣皮湯主之本草檣皮散藏府結熱黃疸	枳實梔子豉湯七	枳實三枚梔子十四枚豉一升右三味以清漿水七升	空煮又一煮法漿水即淘米之泔水久貯味酸為佳取四升內枳實梔子煮	取二升下豉更煮五六沸去渣分溫再服覆令微似	汗此不取吐而取汗	大病差後勞復者勞復乃病後之餘症枳實梔子湯主	之勞復因病後氣虛邪氣又結於上焦其症不一故不著其病形惟散其上焦之邪足矣後人以峻補之劑
--	--------------------------------	--	---	---	------------------------------	---	------------------	------------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------------------	--------------------------------	---	---



傷寒類方卷上										欽定四庫全書	傷寒類方	治勞復則病變百出矣若有宿食者加大黃如博棋子大五六枚此指勞復之有宿食者治食復之法亦在其中矣吐篇云宿食在上脘當吐之按梔子湯加減七方既不注定何經亦不專治何誤總由汗吐之後正氣已虛尚有痰涎滯氣凝結上焦非汗下之所能除經所云乃不易之法也古方梔子皆生用故入口即吐後人作湯以梔子炒黑不復作吐全失用梔子之意然服之於虛煩症亦有驗想其清肺除煩之性故在也終當從古法生用為妙
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	---



欽定四庫全書

子部
傷寒類方卷下

詳校官太醫院醫官臣黃晟

編修臣裴謙履勘

覆校官侍講臣張燾

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣趙興文



欽定四庫全書		傷寒類方卷下		吳江徐大椿撰		承氣湯類六		大承氣湯 一		大黃 酒洗 厚朴 半斤炙 枳實 五枚 芒硝 三合 右四味 以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煮取 二升去滓內硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘		欽定四庫全書		傷寒類方		勿服		傷寒若吐若下後不解 壞 不大便五六日上至十餘日 日晡時發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不 識人循衣摸牀惕而不安微喘直視 以上皆陽明危症 中氣津液已耗孤陽獨存胃中 脈弦者生濇者死 陰弦則 乾燥或有燥屎故現此等惡症 微者但 尚有可生之理未必盡生濇則斷無不死者也 發熱 潮熱 譫語者 惡症 大承氣湯主之若一服利止後服 即止	
--------	--	--------	--	--------	--	-------	--	--------	--	--	--	--------	--	------	--	----	--	--	--



陽明病譫語有潮熱反不能食者客熱不能消穀胃中必有燥	屎五六枚若能食者但鞭爾能食非真欲食不過粥飲	氣全不可近腸宜大承氣湯下之鞭即可下按燥屎	胃實極故也宜大承氣湯下之當在腸中今云胃中	何也蓋邪氣結成糟粕未下則在胃中欲下則	在腸中已結者即謂之燥屎言胃則腸已該矣	汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也陽明本自汗	汗出者此指明汗出之為風則知汗出須下之過經乃	乃表邪尚在不汗出者為火邪內結也	可下之此下之時下之若早語言必亂譫語輕於以表虛裡實	故也下早則引表邪入裡故表虛而裡實下之則愈宜大承氣湯雖已誤	欽定四庫全書 傷寒類方	譫語等症則更下之亦不因誤下而遂不復下也	二陽併病同起者為合病一經未罷一經又病者為併病太陽症罷但發潮熱	手足絳絳汗出大便難而譫語者以上皆陽明現症下之則愈	宜大承氣湯	陽明病下之心中懊憹而煩此乃下之未盡胃中有燥	屎者可攻胃中燥屎必別有現症腹微滿初頭鞭後必溏不可下	也僅微滿則無燥若有燥屎者宜大承氣湯	病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明
--	---	---	---	--	--	---	---	---------------------------------------	---	---	--	---	--	--	--------------	---	---	---	------------------------------



也脈實者宜下之脈虛浮者宜發汗下之與大承氣湯		發汗宜桂枝湯	詳解前桂枝湯下	大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也	所以然者本有宿食故也	惟有宿食故雖大下而燥屎終未盡宜大承氣湯	病人不大便五六日繞臍痛	正在燥屎之位	煩燥發作有時者	此有燥屎故令不大便也	病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘胃不能卧	欽定四庫全書		傷寒類方	者有燥屎也	喘胃不卧燥屎現症宜大便有難無易所以乍易者以小便不利之故燥屎不以易去也	宜大承氣湯	以上三條皆証明有燥屎之法	得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩燥心下鞭	邪熱入裡至	四五日	又隔二日雖能食以小承氣湯少少與微和之用全	方祇通其胃氣而已又用藥之一法	令小安至六日	又隔一日而病未除與大承氣湯一升	亦不必用全方古人用藥雖現症鑿鑿而輕方小試敬慎小心如此	若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭	小便不利則水穀未盡分大便猶濕也	攻之必澹須小便利屎定鞭乃可
-----------------------	--	--------	---------	-----------------------	------------	---------------------	-------------	--------	---------	------------	-----------------------	--------	--	------	-------	------------------------------------	-------	--------------	--------------------	-------	-----	----------------------	----------------	--------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------



攻之以下不宜下又一法宜大承氣湯	傷寒六七日目中不了了睛不和皆陽盛之象無表裏症邪已	結在裏大便難身微熱者此為實也邪結為實急下之宜大承	氣湯	陽明病此三字包陽明諸症發熱汗多者急下之此重在汗多恐內熱甚而逼陽	於外以致亡陽也宜大承氣湯	發汗不解腹滿痛者不解二字必兼有陽明症加以腹滿且痛則實邪有微矣急下	之宜大承氣湯	欽定四庫全書 傷寒類方	腹滿不減減不足言雖畧減而仍腹滿也當下之宜大承氣湯以上	諸條舉當下之一二症即用下法然亦必須參觀他症而後定為妥	陽明少陽合病必下痢其脈不負者順也負者失也陽少	屬木脈當弦絳陽明屬土脈當洪緩若少陽脈勝為負陽明脈勝為不負也厥陰篇云少陰負跌陽者為順也	少陰屬水跌陽屬土土能勝水則胃氣尚強故為順即此意但彼處乃手足厥冷之利故屬少陰此則屬少陽	為異互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也滑數	明之脈獨見而過盛此為實邪故知有宿食當下之宜此湯	寸口脈浮而大按之反澁尺中亦微而澁有食而反微澁此氣結不
---------------------------------------	---	---	-----------	--	------------------------------------	--	---------------	------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--



通之故 故知有宿食當下之宜大承氣湯	少陰病得之二三日 陽邪初轉入陰 口燥舌乾者急下之 陽邪傳陰	腎水欲涸故當急去其邪以保津液 宜大承氣湯	少陰病自利清水色純青 純青則非寒邪乃肝邪入腎也難經云從前來者為實邪	心下必痛口乾燥者 二症尤見非寒邪 急下之宜大承氣湯 二條	俱重口乾知為熱邪無疑	少陰病六七日腹脹不大便者急下之 不便而脹為日又久是以當下	宜大承氣湯	欽定四庫全書 傷寒類方	下利三部脈皆平 無外邪症 按之心下鞭者 實邪有形 急下之宜	大承氣湯	下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣	湯	下利不欲食者以有宿食故也 傷食惡食凡禁口利亦必因宿食之故 當	須下之宜大承氣湯	下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之	宜大承氣湯
--------------------------	--	--	---	---	----------------------------------	--	--------------	------------------------	--	-------------	------------------------------	----------	--	-----------------	------------------------------	--------------



下利脈反滑當有所去脈滑則實邪不留下之乃愈宜大承氣	湯病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣湯	脈雙弦而遲者必心下鞭木邪乘土脈大而緊者陽中有陰	也大為陽緊為陰可以下之宜大承氣湯按以上七條見傷寒論可下條內似指雜	症可下法不入六經治法中	小承氣湯二大承氣去芒硝厚朴枳實亦減	大黃四兩厚朴二兩枳實三枚右三味以水四升者	取一升二合去渣分溫二服初服湯當更衣不爾者	欽定四庫全書傷寒類方	盡飲之若更衣勿服	陽明病脈遲雖汗出不惡寒者凡汗出者皆惡寒其身必重短	氣腹滿而喘有潮熱者以上皆內實之症此外欲解寒不惡可攻裡	也手足濇然汗出者此大便已鞭也四支為諸陽之本濇然汗出陽氣已	盛於土中矣以此驗大便之鞭又一法大承氣湯主之若汗多微發熱惡	寒者外未解也其熱未潮未可與承氣湯若腹大滿不	通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下腹滿不通雖外未解	亦可用小承氣此方乃和胃之品非大下之峻劑故也
--	----------------------------	---	---	--------------------	---	--	-----------------------------	----------------------------------	-----------------	--	---	--	--	------------------------------	---	------------------------------



陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之 潮熱而便不鞭亦禁下 若不大便六七日恐有燥屎欲知之	法少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也 此以藥探	之又乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不	可攻之攻之必脹滿不能食也 邪氣因正虛而陷入 欲飲水者與	水則噦 寒熱相爭則噦 其後發熱者必大便復鞭而少也 重傷津液	以小承氣湯和之 仍用小承氣以大便鞭故也 不轉失氣者慎不可	攻也 又再由前戒聖人之慎下如此	欽定四庫全書 傷寒類方	陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則	譴語 譴語由便鞭便鞭由胃燥胃燥由汗出津液少層層相因病情顯著 小承氣湯主之	若一服譴語止更莫復服	陽明病譴語發潮熱脈滑而疾者小承氣主之 因滑疾則易下	故止用小承氣 因與小承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升	若不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微澹者裡虛	也為難治 攻之不應是為難治 不可更與承氣也	太陽病若吐若下若發汗後 治過 微煩小便數大便因鞭
---	---	-----------------------	--	---	---	--------------------------------	----------------	-----------------------	---	------------	--	--	-----------------------	--------------------------------------	---



者因字當著眼大便之鞭由小便數之所致蓋吐下

承氣湯和之愈

下利譫語者有燥屎也

利而仍譫語邪火不因利而息則必有燥屎蓋燥屎不因下利

而去也後醫見利則不復下豈知燥屎之不能自出乎

調胃承氣湯

三

大黃

四兩去皮清酒洗

甘草

二兩炙

芒硝

半升

右三味以水三

升先煮大黃甘草取一升去滓內芒硝更上火微煮

令沸少少溫服之

按芒硝善解結熱之邪大承氣用之解已結之熱邪此方用之以解

欽定四庫全書

傷寒類方

將結之熱邪其能調胃則全賴甘草也

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂

枝湯攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作

甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥

甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃

承氣湯

陰陽錯雜之症多方以救之必有餘邪在胃故少與以和之餘詳雜方條

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣

與調胃承氣湯

此必發汗後無他症但現微寒微熱故止作虛實觀否則安知非更有餘邪將



復變他 症耶	太陽病未解脈陰陽俱停 脈法無停字疑似沉滯不起即下微字之義寸為陽尺為	陰先振慄汗出乃解 而復和 但陽脈微者先汗出而解	當發其陽但陰脈微者下之而解 當和其陰 若欲下之宜調胃承	氣湯 按此微字即上停字之意與微弱不同微弱則不當復汗下也	傷寒十三日不解 二 過經譫語者以有熱也當以湯下	之 如大小承氣之類 若小便利者大便當鞭而反下利脈調和	者 此言下後之症 知醫以丸藥下之非其治也 下非誤下之法誤 若自	欽定四庫全書 傷寒類方	下利者脈當微厥今反和者知為內實也調胃承氣湯	主之 當下而下非其法餘邪未盡仍宜更下	太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反	溏腹微滿鬱鬱微煩 以上皆類少陽症 先其時自極吐下者 邪氣	乘虛入與調胃承氣湯 以滌胃邪 若不爾者不可與 未經吐下則邪在半	表半裡不得用下法但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡症以嘔故	知極吐下也 此段疑有誤字	陽明病不吐不下心煩者 未經吐下而心煩中氣實也 可與調胃承
-----------	--	--	--	--	--	---	---	----------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	---	---------------------------	-----------------------------	---



氣湯	太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也 外邪已解內熱未清	此湯主之	傷寒吐後腹脹滿者 已吐而胃中仍滿則非上越所能愈復當下行矣 與調胃	承氣湯	桃核承氣湯 四	桃仁 五十個 大黃 四兩 甘草 二兩 桂枝 二兩 芒硝 二兩 兩 右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上	欽定四庫全書	傷寒類方	火微沸下火先令溫服五合日三服當微利 微利則通大便	便不定 下血也	太陽病不解熱結膀胱 太陽之邪由經入腑 其人如狂血自下下	者愈 膀胱多氣多血熱甚則血凝而上干心包故神昏而如狂血得熱而行故能自下則邪從血出與陽	明之下 燥屎同 其外不解者尚未可攻 外不解而攻之則邪反陷入矣 當先解	外宜桂枝湯外解已但小腹急結者乃可攻之宜桃核	承氣湯 小腹急結是蓄血現症按宜桂枝湯四字從金匱增入	抵當湯 五
----	---	------	---	-----	------------------------	---	--------	------	---	------------	--	--	--	-----------------------	--	----------------------



水蛭 熬 蝨蟲 去翅足熬各三十六個 大黃 酒浸三兩 桃仁 去皮尖二十個	右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再	服	太陽病六七日 經過 表症仍在脈微而沉 裡向 反不結胸 下向	其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿 症外 小便自利者	內症 下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裡故也抵	當湯主之 此亦熱結膀胱之症前桃核承氣乃治瘀血將結之時抵當乃治瘀血已結之後也	太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也 以上	欽定四庫全書 傷寒類方	皆似血症諦因小便不利安知非濕熱不行之故不可斷為有血也 小便自利其人如狂	者血症諦也 並無濕熱而如狂非蓄血而何如此審症無遁形矣 抵當湯主之	陽明症其人喜忘者必有蓄血 心主血血凝則心氣結而失其官矣蓄不甚故	不狂 所以然者本有以瘀血故令喜忘 此乃舊病非傷寒時所得者 屎	雖鞭大便反易 血性滑利 其色必黑 浮血亦有隨 宜抵當湯	下之	病人無表裡症發熱七八日 經過 雖脈浮數者可下之 雖脈	浮數而無表裡症則其發熱竟屬裡實矣七八日故可下 假令已下脈數不解合熱
--	-----------------------------	----------	---	--	---	---	---	-----------------------------------	---	--	---	---	--	-----------	---	---



則消穀善饑脈數不解邪本不在大便秘也消穀善至六	七日更蓄血不大便者有瘀血也宜抵當湯其脈數不解	而下不止必協熱而便膿血也此指服湯後之變症熱邪不因下而去又動其	血則血與便合為一而為便膿血之症又當別有治法按瘀血又有但欲漱水不欲嚥之症蓋唇口乾燥而	腹中不能容水也	抵當丸六	水蛭熬 蠪蟲去翅足熬 大黃三兩酒洗 桃仁三十五個去皮尖	右四味搗分為四丸以水一升煮一丸取七合服時	欽定四庫全書傷寒類方	時當下血不下更服時一	傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當	下之不可餘藥宜抵當丸熱而少腹滿又小便不利必兼三者乃為血證諦不可餘	藥謂此症須緩下其血用丸使之徐下	十棗湯七	芫花熬 甘遂 大戟等分 大棗十枚 右三味各	別搗為散以水一升半先煮大棗肥者取八合去滓	內藥末強人服一錢七羸人服半錢得快下利後糜
--	--	--	---	-------------------------------	----------------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------



粥自養平旦溫服若下少病不除者明日更服	太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人黎黎汗出	發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛水停也乾嘔短氣	汗出不惡寒者此表解裡未和也不惡寒為表解以上諸症皆裡不和凡蓄	水之症皆如此不特傷寒為然也十棗湯主之服此湯以下蓄飲	大陷胸湯八	大黃六兩 去皮芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先	煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫	欽定四庫全書 傷寒類方	服一升得快利止後服	太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數	則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫	反下之經云病發於陽而反下之熱入因作結胸是也動數變遲正氣益虛膈內拒	痛胃中空虛客氣動膈短氣煩燥心中懊懷陽氣內陷	心下因鞭則為結胸此段明所以致結胸之由及結胸之狀最詳乃因邪在上焦誤下以	虛其上焦之氣而邪隨陷入也此症與承氣法迥殊若不結胸但頭汗出餘處無	汗劑頸而還小便不利身必發黃也此乃誤下而邪氣不陷入上焦反鬱
---------------------------	------------------------------	--	---	--	-----------------------------	---	-----------------------------	------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	--	---	--



於皮膚肌肉之間故現此等症傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下	痛按之石鞭者此段由結胸之象尤明大陷胸湯主之	傷寒十餘日經過熱結在裡復往來寒熱者與大柴胡湯	但結胸無大熱者此為水結在胸脇也結胸本無他物氣與水所停也	但頭汗出者熱結在上大陷胸湯主之	太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴	胸有蓄飲日晡所小有潮熱從心上至少腹鞭滿而痛不可	近者已汗下而大痛如此知非有物之實邪矣前云膈內拒痛又云心下石鞭專指上焦說此云從心上	欽定四庫全書傷寒類方	至少腹鞭滿痛則上下皆痛其根總由心上而起與承氣症自殊大陷胸湯主之	傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯証具而以他藥下之	誤治柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必	蒸蒸而振却發熱汗出而解邪向裡而更虛故汗出為難若心下滿	而鞭痛者此湯主之	大陷胸丸九	大黃半觔 葶歷子熬 芒硝 杏仁各半升去皮尖熬黑 右	四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈
------------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	------------------------------	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------	---	-----------------------------



丸一枚別擣甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效	病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下	之熱入因作痞此明所以致結胸與痞之故發熱惡寒之症則熱入於陽位而作結胸無熱惡	寒之症則熱入於陰位而作痞故治結胸用寒劑治痞用溫劑也所以成結胸者以下	之太早故也二病未嘗不可下但各有其時不可過早耳	結胸者項亦強如柔瘕狀此陷胸之外症下之則和宜大陷胸	丸	欽定四庫全書 傷寒類方	小陷胸湯十	黃連一兩半夏半升枳實大者一枚右三味以水六升	先煮枳實取三升去滓內諸藥煮二升去渣分溫三	服一服未和再服微解下黃涎便安也按大承氣所下者燥屎大	陷胸所下者蓄水此所下者為黃涎涎者輕於蓄水而未成水者也審病之精用藥之切如此	小結胸病正在心下按之則痛上不至心下不及少腹	手與大陷胸症迥別脈浮滑者不若大陷胸症之沉小陷胸湯主	之
--	------------------------------	--	---	--	--	----------	------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	---	---	---	----------



白散 十一	桔梗 貝母 各三分古法二錢五分為一分巴豆 一分去皮心右	三味為散內巴豆更於白中杵之以白飲和服強人	服半錢匕 今秤約重三分羸者減之病在膈上必吐在膈下	必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一盃 巴豆得熱	則行得身熱皮粟不解 畏冷起欲引衣自覆者若以	水澀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假	令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法	欽定四庫全書	傷寒類方	寒實結胸 結胸皆係熱陷之症此云寒實乃水氣寒冷所結之痰飲也無熱症者與	三物小陷胸湯白散亦可用 按活人書云與三物白散無小陷胸湯亦可用七字	蓋小陷胸寒劑非無熱之所宜也	麻仁丸 十二即小承氣加芍藥二仁也	麻子仁 二升芍藥 各半枳實 各半大黃 厚朴	杏仁 各一升去皮尖右六味為末煉蜜和丸如梧	桐子大飲服十丸漸加以知為度	跌陽脈浮而濇浮則胃氣強 盛陽濇則小便數 足陰不浮濇
------------------	--	-----------------------------	--	---	--	-----------------------------	------------------------	---------------	-------------	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------	--



相搏大便則難其脾為約 此即論中所云太陽陽明者脾約是也 麻仁丸		主之 太陽正傳陽明不復再傳故可以緩法治之		瀉心湯類七		生薑瀉心湯 一		生薑 四兩 甘草 炙 人參 黃芩 各三兩 半夏 半升		黃連 乾薑 各一兩 大棗 十二枚 右八味以水一斗煮		取六升去渣煎取三升溫服一升日三服		傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下		欽定四庫全書 傷寒類方		有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之 汗後而邪未盡必有		留飲在心下其症甚雜而方中諸藥一一對症內中又有一藥治兩症者亦有兩藥合治一症者錯綜變化攻補兼施寒熱互用皆本內經立方諸法其藥性又有與神農本草所載無處不合學者能於此等方講求其理而推廣之則操縱在我矣凡瀉心諸法皆已汗已下已吐之餘疾		甘草瀉心湯 二 即生薑瀉心湯去人參生薑加甘草一兩		甘草 四兩 黃芩 乾薑 各三兩 半夏 半升 黃連 一兩		大棗 十二枚 右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取		三升溫服一升日三服	
---	--	-------------------------------------	--	-------	--	------------------------	--	--	--	---	--	------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	-----------	--



傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中	雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂	病不盡復下之其痞益甚此非熱結但以胃中虛 兩次誤下	故用甘草以補胃而痞自除俗醫以甘草滿中為痞嘔禁用之藥蓋不知虛實之義者也 客氣上逆	故使鞭也甘草瀉心湯主之	半夏瀉心湯 三	半夏 半升 黃芩 半升 乾薑 炙 甘草 炙 人參 各三兩	黃連 一兩 大棗 十二枚 右七味以水一斗煮取六升去	欽定四庫全書 傷寒類方	渣再煎取三升溫服一升日三服	傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之	柴胡証仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸	蒸而振却發熱汗出而解 本症仍在則即用本方治之 若心滿而不	痛者此為痞 又指不痛二字痞症尤的 柴胡不中與之宜半夏瀉心	湯 以上三瀉心之藥大半皆本於柴胡湯故其所治之症多與柴胡症相同而加治虛治痞之藥耳	大黃黃連瀉心湯 四	大黃 二兩 黃連 一兩 右二味以麻沸湯二升漬之須
-----------------------	-----------------------	---	--	-------------	------------------------	---	---	----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---	---	--	--------------------------	--



史絞去渣分溫再服 此又法之最奇者不取煎而取 泡欲其輕揚清淡以滌上焦之	脈浮而緊而復下之緊反入裡則作痞 緊脈為陰此所 謂病發於陰下	之作痞 按之自濡但氣痞耳 并無脇 下之水 心下痞按之濡其	關上浮者 邪氣甚高 大黃黃連瀉心湯主之	傷寒大下後復發汗 再誤 心下痞惡寒者表未解也不可	攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜	此湯 詳見前桂 枝類中	欽定四庫全書 傷寒類方	附子瀉心湯 五	大黃 二兩酒浸 黃連 炒 黃芩 炒各一兩 附子 一枚去皮別煮取汁 右四	味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去渣內附子	汁分溫再服 此法更精附子用煎三味用泡扶陽欲 其熱而性重開痞欲其生而性輕也	心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之 此條不過 二語而妙	理無窮前條發汗之後惡寒則用桂枝此條汗出惡寒 則用附子蓋發汗之後汗已止而猶惡寒乃表邪未盡	故先用桂枝以去表邪此惡寒而仍汗出則亡陽在即 故加入附子以回陽氣又彼先後分二方此併一方者	何也蓋彼有表復有裡此則 祇有裡病故有分有合也
---	--	---	---	--	------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------	---	--	---	---	--



黃連湯 六 即半夏瀉心湯 去黃芩加桂枝	黃連 炙 甘草 炙 乾薑 桂枝 去皮各三兩 人參 二兩	兩 半夏 半升 大棗 十二枚 右七味以水一斗煮取六升	去滓溫服一升日三夜二服 治上焦之病故服藥宜少而數	傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯	主之 諸瀉心之法皆治心胃之間寒熱不調全屬裡症此方以黃芩易桂枝去瀉心之名而曰黃連湯乃表邪尚有一分未盡胃中邪氣尚當外達故加桂枝一味以和表裡則意無不到矣	黃芩湯 七	欽定四庫全書 傷寒類方	黃芩 三兩 甘草 炙 芍藥 各二兩 大棗 十二枚 右四味以	水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服	黃芩加半夏生薑湯 八	黃芩 三兩 甘草 炙 芍藥 各二兩 半夏 半升 生薑 三兩	大棗 十二枚 右六味以水一斗煮取三升去渣溫服一	升日再夜一服	太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加	半夏生薑湯主之 下利即專於治利不雜以風寒表藥此亦急當救裡之義若嘔亦即兼以
---	--	---	--	------------------------------	---	-----------------------------	--------------------	--	---------------------------	----------------------------------	---	---	---------------	------------------------------	--



止嘔之藥總之見症施治服藥後而本症愈復見他症則仍見症施治可推而知也	乾薑黃連黃芩人參湯 九	乾薑 黃連 黃芩 人參 各三兩 右四味以	水六升煮取二升去渣分溫再服	傷寒本自寒下 本症 醫復吐下之 誤治 寒格更逆吐下若食	入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之 此屬厥陰條寒格自用乾薑吐	下自用芩連因誤治而虛其正氣則用人參分途而治無所不包又各不相礙古方之所以入化也	旋復代赭湯 十	欽定四庫全書 傷寒類方	旋復花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩 甘草 三兩 半夏 半	升 代赭石 一兩 大棗 十二枚 右七味以水一斗煮取六	升去渣再煎取三升溫服一升日三服	傷寒發汗若吐若下解後 病久治多未 心下痞鞭噫氣	不除 靈樞口問篇云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噫俗名噯氣皆陰陽不和於中之故	旋復代赭湯主之 此乃病已向愈中有留邪在於心胃之間與前諸瀉心法大約相近本草	云旋復治結氣脇下滿代赭治腹中邪毒氣加此二物以治噫餘則散痞補虛之法也	厚朴生薑甘草半夏人參湯 十一
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------	---	---	--	------------------------	-------------	--	--	-----------------	--	---	---	-----------------------------------	-------------------------------



厚朴半觔炙 生薑 半夏各半 甘草二兩 人參一	兩 右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三	服	發汗後腹脹滿者此湯主之 發汗後則邪氣已去而猶腹脹滿乃虛邪入腹故以	厚朴除脹滿餘則補虛助胃也	白虎湯類八	白虎湯一	知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 右四味以	欽定四庫全書 傷寒類方	水一斗煮米熟湯成火去滓溫服一升日三服	傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒此寒熱二字必倒誤乃表有寒裏有熱也觀下	條脈滑而厥者裏有熱也鑿鑿可証活人書作表裏有熱亦未穩 白虎湯主之	傷寒脈滑而厥者熱裏有熱也白虎湯主之	三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺	尿以上皆陽明熱症之在經者以三陽統於陽明也但身重腹滿則似風濕宜用術附面垢譫語則似胃實	宜用承氣此處一惑生死立判如何辨發汗則譫語從	別全在參觀脈症使有顯據方不誤投發汗則譫語從	越此下之則額上生汗手足逆冷此陰從若自汗者白虎湯
---	----------------------------------	----------	--	------------------------------------	--------------	----------------------------	---	------------------------	--	--	---	---	------------------------------	---	--	--	--



主之自汗則熱氣盛於經非石膏不治按亡陽之症 有二下焦之陽虛飛越於外而欲上脫則用參附 等藥以回之上焦之陽盛逼陰於外而欲上洩則用石 膏以收之同一亡陽而治法迥殊細審之自明否則生 死立 判	白虎加人參湯 二	白虎湯原方加人參 三兩 煮服同前法	服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者此湯主之 煩渴不解因汗多而胃液乾枯邪雖去而陽明之火獨 熾故用此以生津止汗息火解煩汗後諸變不同總宜 隨症 用藥	欽定四庫全書 傷寒類方	傷寒若吐若下後 前汗後此 吐下後 七八日不解熱結在裏表	裏俱熱 此四字為 時時惡風 表邪未盡 大渴舌上乾燥而煩	欲飲水數升者 胃液已盡不在經不在腑亦非若承氣 症之有實邪因胃口津液枯竭內火如	此與熱邪在府者迥別 此湯主之	傷寒無大熱 熱在內 口燥渴心煩背微惡寒者 此亦虛燥 之症微惡	寒謂雖惡寒而其微又周身不寒寒獨在背 此湯主之 知外邪已解若大惡寒則不得用此湯矣	傷寒脈浮發熱無汗 無汗二字最 其表不解者 惡寒不可 為白虎所忌	與白虎湯渴欲飲水無表症者 不惡寒 白虎加人參湯主
---	--------------------------------	---	--	--	---	--	--	--------------------------------------	---	---	--	--



之 白虎加參湯大段治汗吐下之後邪已去而有留熱 在於陽明又因胃液乾枯故用之以生津解熱若更 虛羸則為竹葉石膏湯症矣 壯 火食氣此方瀉火即所以生氣也	竹葉石膏湯 三	竹葉 二把 石膏 一斤 半夏 半升 人參 三兩 麥門冬 一	升 甘草 二兩 粳米 半升 右七味以水一斗煮取六升	去滓內粳米煮米熟湯成 又法 去米溫服一升日三	服	傷寒解後虛羸少氣 人參 冬氣逆欲吐者 半夏 竹葉石膏	欽定四庫全書 傷寒類方	湯主之 此仲景先生治傷寒愈後調養之方也其法專 於滋養肺胃之陰氣以復津液蓋傷寒雖六經 傳遍而汗吐下三者皆肺胃當之又內經云人之傷於 寒也則為病熱故滋養肺胃岐黃以至仲景不易之法 也後之庸醫則用溫熱之藥峻補脾 腎而千聖相傳之精義消亡盡矣	五苓散類九	五苓散 一	猪苓 十八銖 澤瀉 六銖 白朮 十八銖 茯苓 十八銖 桂枝 兩半	去 皮 右五味為末以白飲和服方寸七日三服多飲煖	水汗出愈 服散取其停留胸中多 飲煖水取其氣散營衛
---	----------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------------------	--------------------	--	--------------	--------------	---	--------------------------------	--



太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水	者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱	消渴者與五苓散主之	胃中乾而欲飲此無水也與水則愈小便不利而欲飲此蓄水	也利水則愈同一渴而治法不同蓋由同一渴而渴之象及渴之餘症亦各不同也	發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之	汗不盡則有留飲	中風發熱六七日不解而煩有表裡症渴欲飲水水入	則吐者名曰水逆	胸中有水則不能容水矣	五苓散主之	桂枝治表餘四味治	裏 多飲煖水汗出愈	表裏俱到	欽定四庫全書	傷寒類方	本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥	煩小便不利者五苓散主之	治痞而痞不解反渴則為水停心下之故非痞也	太陽病寸緩關浮尺弱	皆為虛象	其人發熱汗出復惡寒不	嘔但心下痞者此以醫下之也	誤治	如其不下者病人不	惡寒而渴者此轉屬陽明也	此屬實邪	小便數者大便必鞭	不更衣十日無所苦也渴欲飲水者少少與之但以法	救之	隨症施治不執一端	渴者與五苓散	如其渴不止五苓散亦一法也	霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之	亦此
-----------------------	-----------------------	-----------	---	---	----------------	------------------------	-----------------------	---------	---------------------------	-------	-------------------------	--------------------------	---------------------	--------	------	-----------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------------------	------------	--------------	-------------------	----------	-------------	---------------------	----------	-----------------------	----	-------------------------	--------	-----------------------------	----------------------	-------------------

欽定四庫全書

傷寒類方



表裏同治之法	猪苓湯 二	猪苓 去皮	茯苓	澤瀉	滑石 碎	阿膠 各一兩	右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱	消溫服七合日三	陽明病若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主	之 此陽明之渴故與五苓相近而獨去桂枝恐助陽也論中又云陽明汗多而渴不可與猪苓湯以胃中燥	不可更利其小便也	欽定四庫全書	傷寒類方	少陰病下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠者此湯主	之 此亦熱邪傳少陰之症蓋少陰口燥口乾有大承氣之急下之法今止嘔渴則熱邪尚輕故用此方使熱邪	從小便出其路尤近也	文蛤散 三	文蛤 五兩	右一味為散以沸湯和一方寸匕服湯用	五合	病在陽應以汗解之反以冷水澀之若灌之其熱被劫	不得去彌更益煩肉上粟起 寒在肉中意欲飲水反不渴者
--------	-------	-------	----	----	------	--------	----------------------	---------	-----------------------	--	----------	--------	------	-----------------------	---	-----------	-------	-------	------------------	----	-----------------------	--------------------------



服文蛤散 此熟結在皮膚肌肉之中不在胃口若不差	者與五苓散 不應則表裡同治	茯苓甘草湯 四	茯苓 二兩 桂枝 二兩 甘草 炙 一兩 生薑 三兩 右四味以	水四升煮取二升分溫三服	傷寒汗出而渴者五苓散主之 桂枝止汗餘四味止渴 不渴者茯苓	甘草湯主之 此方之義從未有能詮釋者蓋汗出之後並無渴症又未指明別有何症忽無端而與茯苓甘草湯此意何居要知此處汗出二字乃發汗後汗	出之後並無渴症又未指明別有何症忽無端而與茯苓甘草湯此意何居要知此處汗出二字乃發汗後汗	欽定四庫全書 傷寒類方	出者當與以茯苓桂枝白朮甘草湯更輕者則與以此	湯何以知之以三方同用茯苓知之蓋汗大洩必引腎	水上泛非茯苓不能鎮之故真武則佐以附子回陽此	二方則以桂枝甘草飲汗而茯苓則皆以為主	藥此方之義不了然乎觀下條心悸治法益明	傷寒厥而心下悸者宜先治水 水犯心 當服茯苓甘草	湯 本草茯苓治心下結痛惡悸 却治其厥不爾水漬入胃必作利也	四逆湯類十	四逆湯 一 甘草 炙 二兩 乾薑 半 一兩 附子 皮 一枚生用去 右三味以水
--	-------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------	--	---	---	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	--	--------------	---



三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚常人則取中者小者可知乾薑三兩按方名四逆必以之治厥冷不待言而可知此方溫中散寒故附子用生者 四逆理中皆溫熱之劑而四逆一類總不離乾薑以通陽也治宜中焦餘藥皆相同而功用迥別	傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥	欽定四庫全書 傷寒類方	甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯以上義詳雜方條內若重發汗復加燒針者四逆湯主之陰陽兩虛之後又復竭其陽非此湯不能挽回陽氣	傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裡後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表	宜桂枝湯說詳前桂枝條內	病發熱頭疼此乃邪氣脈反沉見裡若不差身體疼痛當救	其裏宜四逆湯身體疼痛陰陽二症皆有之今脈沉而疼痛雖發熱亦是裏寒外熱之症故用
--	--	------------------------	---	---	-----------------------------------	--	--



四逆	脈浮而遲表熱浮裏寒遲下利清穀者四逆湯主之	自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也明所以不渴之故當溫	之宜四逆輩有寒則不渴則知渴者皆當作熱治不曰四逆湯而曰四逆輩凡溫熱之劑皆可選	用	少陰病脈沉者急溫之病與脈相合則溫不可遲宜四逆湯	少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐此二句指	不食之時言此與少陽之嘔當有分別宜以他症驗之始得之手足寒脈弦遲者	欽定四庫全書傷寒類方	此胸中實始得言病方起脈弦則有力故知為實不可下也欲吐則病在上焦下之為	逆當吐之在上者因而越之此少陰宜吐之法若膈上有寒飲乾嘔者乾	無物則知不可吐也當溫之寒飲無實物溫之則寒散其為飲矣而飲亦去矣凡治飲皆用	溫法宜四逆湯大汗出熱不去內拘急四肢疼以上皆外症其疼亦	屬陰又下利清穀厥逆而惡寒者三者皆虛寒內症四逆湯主之	按此條諸症皆屬陰寒固為易辨惟熱不去三字則安知非表邪未盡即惡寒亦安知非太陽未罷之惡寒惟	下利厥逆則所謂急當救裏不論其有表無表而扶陽不可緩矣	大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之汗下後而厥冷則虛寒極矣
-----------	---	--	---	----------	---	---	---	----------------------------------	--	---	---	--	--	---	----------------------------------	--



嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治 亦外熱內虛寒之故	四逆湯主之	吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之	之既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱	脈微欲絕者四逆湯主之 以上五條皆係汗下之後陽氣大虛故雖外有微熱而總	以扶陽為急大小便俱利則內陽亦盡矣不僅手足逆冷為陽微之驗也	四逆加人參湯 二	四逆湯原方加人參一兩煎服法同	欽定四庫全書 傷寒類方	惡寒脈微而復利利止亡血也 按亡陰即為亡血不必真脫血也成無已註引	金匱玉函曰水竭則無血謂利止則津液內竭 四逆加人參湯主之 加參以生津液	通脈四逆湯 三	甘草 二兩 炙 乾薑 三兩 強 人四兩 附子 一枚 生用 右三味以水三升	煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈 面	色赤者加蔥九莖 腹中痛者去蔥加芍藥二兩	嘔者加生薑二兩 咽痛者去芍藥加桔梗一兩	利止脈不出者去桔梗加人參二兩 補益津液
--	-------	------------------------	-----------------------	---	---	----------------------------	----------------	-------------------------------	---	---	---------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------



少陰病下利清穀裏寒外熱寒逼陽於外手足厥逆外脈微	欲絕內身反不惡寒寒邪已入裡其人面色赤越陽或腹痛或	乾嘔或咽痛升陽或利止脈不出者通脈四逆湯主之其	脈即出者愈諸症或陽或陰乃閉塞不通之故用辛溫通陽之品以治之其兼症不同詳加減法	下利清穀裏寒外熱汗出而厥者汗出而厥陽有立亡之象通脈四	逆湯主之	通脈四逆加猪胆汁湯四	通脈四逆原方加猪胆汁半合煎如前法煎成內猪	欽定四庫全書 傷寒類方	胆汁溫服其脈即出猪胆汁苦滑之極引藥直達下焦	吐已下斷利止也汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者	通脈四逆加猪胆汁湯主之	乾薑附子湯五	乾薑一兩附子一枚生用去皮切八片右二味以水三升煮取	一升去渣頓服	下之後復發汗先竭其陰後竭其陽晝日煩躁不得眠夜而安靜	陽虛有二症有喜陽者有畏陽者大抵陰亦虛者畏陽陰不虛者喜陽此因下後陰亦虛故反畏陽也 不
--	--	--	---	--	-------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------	---	--	--------------------	------------------------------	---	---------------	---	--



嘔不渴無表証脈沉微身無大熱者此邪已退而陽氣衰弱故止用薑附
陽回乾薑附子湯主之

白通湯六

乾薑附子湯原方加葱白四莖煎服法照前

少陰病下利白通湯主之此專治少陰之利用葱白所以通少陰之陽氣

白通加猪胆汁湯七

白通湯原方加人尿五合猪胆汁一合右三味以水

三升煮取一升去渣內胆汁人尿和令相得分溫再

欽定四庫全書

傷寒類方

服無胆汁亦可

少陰下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩

者無脈厥逆嘔而且煩則上下俱不通陰陽相格故加猪胆汁人尿引陽藥達於至陰而通之內經所云反佐

以取之白通加猪胆汁湯主之服湯脈暴出者死微續

是也暴出乃藥力所迫藥力盡則氣仍絕微續乃正氣者生自復故可生也少陰篇云少陰病下利不止惡

寒而踰卧手足溫者可治則又當以手足之溫驗其陽之有無也前云其脈即出者愈此云暴出者死蓋暴

出與即出不同暴出一時出盡即出言服藥後少頃即徐徐微續也須善會之

茯苓四逆湯八



茯苓四兩一本 人參一兩 附子一枚 甘草二兩 乾薑二兩	半一兩 右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日	三服	發汗若下之病仍不解煩躁者此陽氣不攝而煩所謂	症方不誤認 茯苓四逆湯主之本草茯苓治	四逆散九	甘草炙 枳實 柴胡 芍藥 右四味各	十分搗篩白飲和服方寸七日三服 欬者加五味	欽定四庫全書 傷寒類方	子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小	便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚炮	令拆 泄利下重者先以水五升煮薤白取三升去	渣以散方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服別錄	主溫中 散結	少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或	泄利下重者此乃少陰傳經之熱邪並無脈微惡寒等	不得用 四逆散主之疎邪通氣同名四逆與前諸	溫熱
--	--	-----------	---	---	----------------------------	---	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---------------	------------------------------	---	---	--------------------------



當歸四逆湯 十	當歸 桂枝 芍藥 細辛 各三兩 甘草	通草 各二兩 大棗 二十枚 右七味以水八升煮取三升溫	服一升日三服	當歸四逆加吳茱萸生薑湯 十一	當歸 甘草 通草 各二兩 芍藥 桂枝	細辛 各三兩 大棗 二十枚 吳茱萸 二升 生薑 半斤 右九味	以水六升清酒六升和煮取五升去渣分溫五服	欽定四庫全書 傷寒類方	手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之 此四逆乃太陽傳經之邪	而表症猶未罷因陽氣已虛故用桂枝湯加當歸和血細辛溫散以和表裏之陽也若其人內有	久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之 內有久寒必從問而得之或另有現症乃為可據吳茱萸生薑溫中散	寒其性更烈按前四逆諸法皆主於溫此二方則溫中兼通陽下利脈大者虛也 凡症虛而脈反大者皆元氣不固也以其強	下之故也 推求所以致虛之故設脈浮革 辨脈法篇云脈弦而大則為芤減	則為寒芤則為虛虛因而腸鳴者 腸鳴亦氣不屬當歸	四逆湯主之
-------------------------------	--	---	---------------	--------------------------------------	--	---	----------------------------	--------------------	---	--	---	---	--	--	--------------



理中湯類十一									
理中丸									
人參 甘草 白朮 乾薑 各三兩 右四味搗									
篩為末蜜和為丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸									
研碎溫服之日三四服夜二服腹中未熱益至三四									
丸然不及湯									
理中丸與湯本屬一方 方法以四物依兩數切用									
水八升煮取三升去渣溫服一升日三服									
急則用湯 若臍									
上築者腎氣動也去朮加桂四兩									
即欲作奔豚桂枝加桂之法 吐									
欽定四庫全書 傷寒類方									
多者去朮加生薑二兩									
有乾薑而復加生薑知乾薑不治嘔也 下多者									
還用朮									
朮能止利 悸者加茯苓二兩									
悸為心下有 渴欲飲									
水者加朮足前成四兩半									
消飲生津 腹中痛者加人參足									
前成四兩半									
此痛因氣不足之故別錄云人參治心腹鼓痛 寒者加乾薑足									
前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚									
此腹滿乃陽氣不充之故									
服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿揭衣被									
桂枝湯之飲熱粥欲其助藥力以外散此飲熱粥欲其助藥力以內溫									
霍亂頭痛發熱身疼痛									
論中又云嘔吐而利名曰霍亂又云頭痛則身疼惡寒吐利名									



曰霍亂合觀之則霍亂之症始備蓋亦傷寒之類後人以暑月之吐利當之而亦用理中更造為大順散者皆無稽之論也 熱多欲飲水者五苓散主之 此寒勝熱之霍亂按霍亂之症皆由寒熱之氣不和陰陽拒格上	用水者理中湯主之 此寒勝熱之霍亂按霍亂之症皆由寒熱之氣不和陰陽拒格上	下不通水火不濟之所致五苓所以分其清濁理中所以壯其陽氣皆中焦之治法也	大病差後喜唾 兼有寒飲 久不了了胃上有寒當以丸	藥理之 當緩治之 宜理中丸	真武湯 二	茯苓 芍藥 生薑 各三兩 白朮 二兩 附子 一枚	欽定四庫全書 傷寒類方	右五味以水八升煮取三升去渣溫服七合日三服	若噉者加五味子半升細辛乾薑各一兩 若小	便利者去茯苓 若下利者去芍藥加乾薑二兩 此即	下利清穀之類故去芍藥加乾薑若熱利則芍藥又為要藥也須審之 若嘔者去附子	加生薑足前成半斤	太陽病發汗汗出不解 太陽病乃桂枝症也其發汗當取微似汗則衛氣泄而不傷營	若發汗太過動其營血大汗雖出而衛邪反內伏所以病仍不解觀前桂枝湯條下服法可推而知也 其人仍發熱 表邪仍在 心下悸 下焦腎水因心液 頭眩身瞤動
--	--	--	--	------------------------------------	---------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	--	-----------------	--	--



振振欲擗地者陽氣洩則虛真武湯主之此方鎮伏腎水挽回陽氣	少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉	重疼痛自下利者以上濕邪之症此為有水氣水亦濕也其人或咳	或小便利或下利或嘔者此四症或有或無方中加減法俱詳真武湯主	之此方因發汗不合法上焦之津液乾枯腎水上救以	方諸四逆湯此鎮腎氣治逆水不專為汗多亡陽而設治亡陽之	乃正法也	附子湯三	附子二枚茯苓三兩人參二兩白朮四兩芍藥三兩	欽定四庫全書傷寒類方	右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服	少陰病得之一二日口中和寒邪已微其背惡寒者當灸之	但背惡寒則寒邪聚於一處故用灸法按白虎加人	參湯亦有背微惡寒之症乃彼用寒涼此用溫熱何也	蓋惡寒既有微甚之不同而其相反處全在口中和與	口燥渴之迥別故欲知裡症之寒熱全在渴不渴辨之	此傷寒之要訣也附子湯主之此乃病已向愈正氣虛而餘寒尚存之証也	少陰病身體疼手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之此亦	虛寒餘症	甘草附子湯四
---	------------------------------	---	--	---	---	-------------	----------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-------------	------------------------------



甘草 二兩 炙 白朮 二兩 桂枝 四兩 附子 二枚 炮 右四味以	水六升煮取三升去渣溫服一升日三服初服得微	汗則解 即服桂枝湯論中所云風濕發汗汗大出者	其汗但微微似欲出 能食汗出復煩者尚有餘邪服	五合恐一升多者服六七合為始 此言初服之始	風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出	短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之	此段形容風濕之狀病情畧備	欽定四庫全書 傷寒類方	桂枝附子湯 五	桂枝 四兩 皮切八片 附子 三枚 炮 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚	右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服 此按	即桂枝去芍藥加附子湯但彼桂枝用三兩附子用一枚以治下後脈促胸滿之症此桂枝加一兩附子	加二枚以治風濕身疼脈浮濡之症一方而治病迥殊方名亦異彼編入桂枝湯類此編入理中湯類細	思之各當其理分兩之不可忽如此義亦精矣後人何得以古方輕於加減也	桂枝附子去桂加白朮湯 六	白朮 四兩 甘草 二兩 附子 三枚 炮 生薑 三兩 大棗 十二枚
---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------	------------------------------	---------------------	--	----------------	--	---	---	---	---------------------------------------	---------------------	---



右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初服其	人身如痺半日許復服之三服盡其人如冒狀勿怪	此以附朮併走皮內逐水氣 附朮併力則逐水之功愈矣 未得除	故使之耳法當加桂四兩 此即前桂枝附子湯 此本一方二法	以大便鞭小便自利去桂也以大便不鞭小便不利	當加桂 觀此條知桂枝能通小便故五苓散用之 附子三枚恐多也虛弱	家及產婦宜減服之 附子能切陰氣	傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側 濕則身重 不	欽定四庫全書 傷寒類方	嘔不渴 濕而兼寒 脈虛浮而濇者 內外之陽俱虛 桂枝附子湯主之	若其人大便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之 白朮生腸	胃之津液	茯苓桂枝白朮甘草湯 七	茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 各二兩 甘草 炙 右四味以	水六升煮取三升去渣分溫三服	傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉	緊發汗則動經身為振振搖者此湯主之 此亦陽虛而動腎水之症
----------------------	----------------------	--	---	----------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--	---	------	----------------------------	--	---------------	-----------------------	--



即真武症之輕者故其法亦仿真武之意	芍藥甘草附子湯 八	芍藥 甘草 各三兩 附子 一枚炮去皮破八片 右三味以水五	升煮取一升五合去渣分溫三服	發汗病不解反惡寒者虛故也此湯主之 甘草附子加芍藥即有和	陰之意亦邪之甚輕者	桂枝人參湯 九	桂枝 四兩 甘草 炙 四兩 白朮 人參 乾薑 各三兩	欽定四庫全書 傷寒類方	右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三	升 桂獨後煮欲其於治裡症藥中越出於表以散其邪也 去渣溫服一升日再	夜一服	太陽病外症未除而數下之 下之太早又多 遂協熱而利利下	不止 邪陷 心下痞鞭 邪在上焦 表裏 宜桂 裏 宜餘 不解桂	枝人參湯主之 此必數下之後而現虛症故雖協熱而仍用溫補	雜法方類十二	赤石脂禹餘糧湯 一 論中有汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧九疑
-------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------	---	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	---



即此為丸		赤石脂 禹餘糧 各一斤 右二味以水六升煮取二	升去滓分溫三服 二石同煎 方中絕少	傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他	藥下之利不止 一誤醫以理中與之利益甚理中者理	中焦也此利在下焦 下藥太過則 大腸受傷 赤石脂禹餘糧湯主	之 以瀉 治脫復利不止當利其小便 分其清濁 則便自堅	炙甘草湯 二 又名復脈湯	欽定四庫全書 傷寒類方	甘草 四兩 生薑 三兩 人參 二兩 生地黄 一斤 桂枝 三	兩 麥門冬 半斤 阿膠 二兩 麻仁 半斤 大棗 三十枚 右九	味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣內膠	烱消盡溫服一升日三服	傷寒脈結代 脈來緩而時一止復來曰結脈來動而中	曰代皆氣血兩虛而經 心動悸 心主脈脈之止息 灸甘	草湯主之 此治傷寒邪盡之後氣血兩虛之主方	甘草乾薑湯 三
-------------	--	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------



甘草 四兩 乾薑 二兩 右二味以水三升煮取一升五	合去滓分溫再服	芍藥甘草湯 四	芍藥 四兩 甘草 四兩 右二味以水三升煮取一升五	合去滓分溫再服	傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒 以上俱似桂枝症 脚攣	急 裏虛之象只此一症決非桂枝症矣凡辨症必於獨異處著眼 反與桂枝湯欲攻其	表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者 有陽越之象 作甘	欽定四庫全書 傷寒類方	草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘	草湯與之其脚即伸 此湯乃純陰之劑以復其陰也陰陽兩和而脚伸矣 若胃氣	不和譟語者 留邪在中焦 少與調胃承氣湯若重發汗復加	燒針者四逆湯主之 詳見四逆湯條下	問曰証象陽旦 活人書云桂枝湯加黃芩曰陽旦成無已云即桂枝湯別名 按法治	之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而譫語 以上言按法用方而病不	應手其	故安在師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以	知之答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為虛風則生
--	---------	------------------------	--	---------	---	--	--	-------------	-----------------------	--	--	---------------------------------	---	--	-----	-----------------------	-----------------------



微熱虛則兩脛攣病証象桂枝因加附子參其間桂枝加附	湯子增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆兩脛拘急	逆咽中乾煩燥陽明內結陽越在上譫語煩亂更飲甘草乾	薑湯通納陽氣夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍	藥甘草湯陽復而陰又虛爾乃脚伸以承氣湯微澹則	止其譫語以滌陽明所結之餘邪故知病可愈病証象桂枝句以	用藥之次第當如此蓋病証既多斷無一方能治之理	必先分証而施方而其先後之序又不可亂其方有前	後截然相反者亦不得以錯雜為嫌隨機應變神妙無	方而又規矩不亂故天下無不可愈之疾後人欲以一	方治諸症又無一味傷寒類方	茵陳蒿湯五	茵陳蒿六兩梔子十四枚大黃二兩右三味以水一斗	先煮茵陳減六升茵陳為主藥內二味煮取三升去滓分	溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減	病從小便去也先煮茵陳則大黃從小便出此秘法也	陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出	者身無汗齋頸而還小便不利渴欲飲水者此為瘵熱
---	--	---	---	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------	---	------------------------------	------------------------------



在裏身必發黃茵陳湯主之 本草茵陳主熱結黃疸	傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者 陽明瘵熱	茵陳湯主之	麻黃連軹赤小豆湯 六	麻黃 二兩 連軹 二兩 赤小豆 一升 生梓白皮 一升 杏	仁 四十枚 甘草 二兩 生薑 二兩 大棗 十二枚 右八味以潦	一斗 無根之水 先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升	去滓分溫三服半日服盡 連軹即連翹根氣味相近今人不採即以連翹代可	欽定四庫全書 傷寒類方	傷寒瘵熱在裏身必發黃此湯主之 前方欲黃從下解此方欲黃從汗解	乃有表無表之分也	麻黃升麻湯 七	麻黃 二兩 升麻 一兩 當歸 一分 知母 一分 黃芩	萎蕤 各十銖 白朮石膏乾薑芍藥	天冬桂枝茯苓甘草 各六銖 右十四味	以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三
---	--	-------	------------------------------	--	--	---	---	----------------	---	----------	---------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	----------------------



升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈	傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不	至咽喉不利唾膿血泄利不止者 皆上熱下寒之症 為難治此	湯主之 此乃傷寒壞症寒熱互見上下兩傷故藥亦照症施治病症之難藥味之多古方所僅見觀此	可悟古人用藥之法	瓜蒂散 八	瓜蒂 熬黃 赤小豆 各一分 右二味各別搗篩為散已合	治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜	欽定四庫全書 傷寒類方	去滓和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸	亡血虛家不可與之 此即論中所云吐法也梔子豉湯治虛煩非專引吐此方則專	於引吐而已	病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞭氣上	冲咽喉不得息者此為胸中有寒也 寒必兼欬 當吐之 在上者越	之宜瓜蒂散 本草瓜蒂病在胸腹中皆吐下之	病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中 所以陽氣不能四達 心中	滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散
----------------------	-----------------------	---	---	-------------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------



吳茱萸湯 九	吳茱萸 一升 洗 人參 三兩 生薑 六兩 大棗 十二枚 右四味	以水七升煮取二升去渣溫服七合日三服	食穀欲嘔者 必食穀而嘔受病在納 穀之處與乾嘔迥別 屬陽明也吳茱萸	湯主之得湯反劇者屬上焦也 上焦指胸中陽明乃中焦也	少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者吳茱萸湯主之 此胃氣虛寒之症	乾嘔吐涎沫 此涎沫非少陽之乾嘔然亦云 乾嘔者謂不必食穀而亦嘔也 頭痛者 陽明	欽定四庫全書 傷寒類方	之脈上 吳茱萸湯主之 此胃中有 於頭 寒飲之症	黃連阿膠湯 十	黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩 阿膠 三兩 雞子黃 二	右五味以水六升煮三物取二升去渣內膠烱盡	小冷內雞子黃 小冷而內雞子黃則 不至凝結而相和 攪令相得溫服	七合日三服	少陰病得之二三日以上心中煩不得卧此湯主之 此少陰傳經之熱邪擾動少陰之氣故以降	火養陰為治而以雞子黃引藥下達	陰
---------------	---	--------------------------	---	---	---	---	--------------------	--	----------------	--	----------------------------	---	--------------	---	-----------------------	----------



桃花湯	十一	赤石脂	一斤一半全用一半	篩末	乾薑	一兩	粳米	一升	右三味以
水七升煮米令熟去滓內赤石脂末方寸匕溫服七									
合日三服若一服愈餘勿服									
兼末服取其留滯收瀉									
少陰病下利便膿血	寒熱不調則大腸為腐故成膿血與下利清穀絕不同								
桃花									
湯主之	本草赤石脂療下利赤白								
少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下痢不止便									
膿血者桃花湯主之									
欽定四庫全書									
傷寒類方									
半夏散及陽	十二	半夏	洗	桂枝	去皮	甘草	炙	右三味等分各別擣	
篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服									
者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸下火									
令小冷少少嚥之									
治上之藥當小其劑									
少陰病咽中痛	足少陰之脈循喉嚨挾舌本								
半夏散及湯主之									
本草半夏									
治喉咽腫痛桂枝治喉痺此乃咽喉之主藥後人以二味為禁藥何也									
猪膚湯	十三								



猪膚 一斤 右一味以水一斗煮取五升去渣加白蜜	一升白粉五合 當是米粉 熬香和令相得溫分六服	少陰病下利咽痛胸滿心煩者 此亦中焦氣虛陰火上炎之症 猪膚湯	主之 以甘鹹納之	甘草湯 十四	甘草 二兩 右一味以水三升煮取一升五合去滓溫	服七合日二服	桔梗湯 十五	欽定四庫全書 傷寒類方	桔梗 一兩 甘草 二兩 右二味以水三升煮取一升去	渣分溫再服	少陰病二三日咽痛者可與甘草湯 大甘為土之正味能潤腎水越上之	火 不差與桔梗湯 佐以辛苦開散之品別錄云療咽喉痛	苦酒湯 十六	半夏 十四 雞子 一枚 去黃 右二味內半夏著苦酒中以雞	子殼置刀環中安火上令三沸 此等煮法必有深意疑即古所云禁方也	去渣少少含嚥之不差更作三劑
---------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	--------	---------------------------	--------	--------	----------------	--------------------------------	-------	--	--	--------	---	--	---------------



少陰病咽中傷生瘡疑即陰火不能言語聲不出者苦	酒湯主之咽中生瘡此必遷延病久咽喉為火所蒸腐此非湯劑之所能療用此藥飲火降氣內治	而兼外治法也	烏梅丸 十七	烏梅 三百枚 細辛 六兩 乾薑 十兩 當歸 四兩 黃連 一斤	附子 六兩炮 蜀椒 四兩去汗 桂枝 六兩去皮 人參 六兩 黃蘗 六兩	兩 右十味異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核	蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內白中與	欽定四庫全書 傷寒類方	蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十丸日三服	稍加至二十九禁生冷滑物臭食等	傷寒脈微而厥至七八日膚冷陽氣不衛其人躁無暫安時	者此為藏厥此症不治非虵厥也虵厥者其人當吐虵今	病者靜而復時煩此為藏寒虵上入其膈故煩須臾復	止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥	者烏梅丸主之又主久痢此治久痢之聖方也其能治虵諸藥之性當於神農本草	中細細審辨諸方盡然不復一一具載
---	--	---------------	---------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	--	------------------------



白頭翁湯	十八
白頭翁	二兩
黃連	
黃蘗	
秦皮	各三兩
右四味	
以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升	
熱利下重者白頭翁湯主之	凡下重皆屬於熱
下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之	
牡蠣澤瀉散	十九
牡蠣	澤瀉
	蜀漆
	洗去腥
	括婁根
	葶藶子
商陸根	熬
海藻	洗去鹽以
上各等分	右七味異擣下篩
欽定四庫全書	傷寒類方
為散更入白中杵之白飲和服方寸匕小便利止後服	
大病差後從腰以下有水氣者	水流
牡蠣澤瀉散主之	
此治水病之主方	
蜜煎導方	二十
蜜	七合
右一味於銅器內微火煎凝如飴狀攪之勿令焦灼俟可丸併手捻作錠令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲大	



便時乃去之

猪膽汁方

廿一

大猪膽

一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出宿食惡物甚效

陽明病自汗出若發汗小便自利者此乃津液內竭雖

鞭不可攻之當須自欲大便

須待也言必待其自欲大便而後用此法宜蜜

煎導而通之若土瓜根及大猪胆汁皆可為導

燒裨散

廿二

右取婦人中裨近陰處剪燒灰以水和服方寸七日

欽定四庫全書

傷寒類方

三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裨當

燒灰

引其邪火從陰處出也

傷寒陰陽易之為病

病方愈而交接則感其餘熱而生疾

其人身體重少

氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼

中生花膝脛拘急者燒裨散主之

六經脈証

欲讀傷寒論必先識六經之本証然後論中所稱太

陽陽明等病其源流變態形色脈象當一一備記了



然於心然後其症之分併疑似及用藥加減異同之故可以曉然不致眩惑貽誤故備錄於左	太陽病脈浮頭項強痛而惡寒	尺寸俱浮者太陽受病也其脈上連風府故頭項痛腰	脊強	發熱汗出惡風脈緩者名曰中風	惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒	發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽	欽定四庫全書 傷寒類方	者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也	陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊 惡寒未離太陽也	陽明病若能食名中風不能食名中寒	尺寸俱長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目	疼鼻乾不得卧	陽明外証身熱汗自出不惡寒反惡熱也	陽明脈大 以上皆陽明之經病
--------------------------------------	--------------	-----------------------	----	---------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------------	---	-----------------	-----------------------	--------	------------------	------------------------------



有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明

太陽陽明者脾約是也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

陽明之為病胃家實也

此乃正陽陽明

陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自

止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也

尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛

欽定四庫全書

傷寒類方

而耳聾

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下

吐下則悸而驚

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗

內熱已極

傷寒六七日無大熱

外熱輕則內熱重

其人煩燥者此為陽去

入陰也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔



此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於噎故腹

滿而噎乾

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰

自利不渴者屬太陰以藏有寒故也當溫之宜服四逆

輩少陰自利而渴寒在下焦也此自利不渴寒在中焦也

少陰之為病脈微細但欲寐也衛氣行於陽則寤行於陰則寐

欽定四庫全書

傷寒類方

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬

少陰也

尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本

故口燥舌乾而渴

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食

則吐衄下之利不止

尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故

煩滿而囊縮



厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈				
別症變症 附刺法				
傷寒本症之外有別症有變症別症者其病與傷寒相類而實非傷寒是也變症者傷寒本不當有此症或因遷延時日或因雜藥誤投其病變態百出是也其症不備則必驚疑淆惑而無所措手故備錄之庶不致臨症徬徨				
藏結	冷結	除中	伏氣	晚發
欽定四庫全書				
傷寒類方				
瘧	濕	風濕	濕溫	溫毒
暍	陰毒	陽毒	溫病	熱病
兩感	風溫	溫疫	脚氣	多眠
狐惑	百合	藏厥	見烏梅丸條 尸厥	見刺法
藏結				
藏結如結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細				
沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治				
藏結無陽症其人反靜舌上胎滑者不可攻也				



病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰經者此名藏結死

藏結與結胸皆下後邪氣乘虛入裏所致熱多與陽明相結為結胸寒多與陰相結為藏結故所現脈症皆為陰象舌上胎滑則上焦亦寒全無陽象故曰難治曰不可攻然猶有治法至素有痞疾則中氣已傷連及臍旁少腹并入陰經則上下俱病陰極陽竭不死何待

冷結

病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

欽定四庫全書

傷寒類方

除中

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死

微則為欬欬則吐逆下之則欬止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息為難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言舌不得



前	傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食	今反能食恐為除中	此病無治法	伏氣	伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏	氣當須脈之若脈微弱當喉中痛似傷寒非喉痺也病	人云實咽中痛雖爾今復欲下痢	活人書云伏氣之病謂非時有暴寒中人	伏於少陰經始不竟病旬月乃發脈便微弱法先咽痛	似傷寒非咽痺之病	次必下利始用半夏桂枝甘草湯	欽定四庫全書	傷寒類方	主之次四逆散主之此病只二日便差古方謂之腎傷	寒也甘草半夏桂心等分每服四錢匕入生薑四片	煎放冷少	少含嚥之	晚發	脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲	解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未	解食自可者為欲解	活人書傷寒病三月至夏為晚發	瘥	太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘥	金匱治剛瘥用葛根湯大承氣
---	-----------------------	----------	----------------------	----	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------	----------	------------------------------	--------	------	-----------------------	----------------------	------	------	----	-----------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---	-----------------	-----------------------------



湯 俱見前	太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧 柔瘧用括婁桂枝湯	湯加括婁 根二兩 太陽病發汗太多因致瘧	太陽發熱脈沉而細者名曰瘧 此言瘧脈	病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭	搖卒口噤背反張者瘧病也 此言瘧象	濕	太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺之候其	欽定四庫全書 傷寒類方	人小便不利大便反快但當利其小便	濕家之為病一身盡疼發熱身色如似薰黃	濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者	亦死	濕家下之其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之	早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中	有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也	濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈
----------	--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------------	----	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------



大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥
鼻中則愈

風濕

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨
不止醫云此可發汗汗之不愈者何也答曰發其汗汗
大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發
其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也

此言
治法

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於

欽定四庫全書

傷寒類方

汗出當風或久傷取冷所致也

風濕脈浮肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或

身微腫

濕溫

兩脛逆冷胸腹滿多汗頭目痛苦妄言其脈陽濡而弱

陰小而急不可發汗治在太陰

見活
人書

溫毒

冬時觸冒疹毒至春始發肌肉發斑癰疹如錦紋或咳



嗽心悶但嘔清汁

見活人書

暍

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此亦夏月傷冷水水

行皮中所致也

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小

便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板

齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋

欽定四庫全書

傷寒類方

甚

陰毒

手足厥冷背強臍腹築痛咽痛短氣嘔吐下利身如被

杖或冷汗煩渴或甲指面色青黑煩躁而渴脈沉細欲

絕而一息七至宜灸氣海丹田三二百壯或葱熨臍中

氣海在臍下一寸五分
丹田在臍下二寸

陽毒

發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦紋或下利赤黃



脈洪實滑促	或舌卷焦黑鼻中如烟煤宜用布漬冷
水搭於胸上蒸熱數換	活人書法
溫病	
冬時受寒藏於肌膚至春而發	
熱病	
寒氣至夏而發俱與傷寒相似	
兩感	
大陽與少陰	陽明與太陰
	少陽與厥陰
欽定四庫全書	傷寒類方
風溫	
其人素傷於風因復傷熱其脈尺寸俱浮頭疼身熱常	
自汗出體重而喘四肢不收嘿嘿但欲眠發汗則譫語	
煩躁狀若驚癇	
溫疫	
一歲之中男女老少之疾相似其狀不一	
脚氣	
頭疼身熱肢體痛大便秘嘔逆脚屈弱	



多眠	有風溫症有少陰症有小柴胡証有狐惑症	狐惑 此症治法 詳金匱	狀如傷寒或傷寒後變症默默欲眠目不能閉不欲飲食面目乍白乍赤乍黑蟲食其喉為惑其聲啞蝕其肛為狐其咽乾爛見五臟則死當視其唇上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食其肛多因下利而得濕蘊之病亦相似	欽定四庫全書 傷寒類方	百合 此症詳金匱 治法亦備	此亦傷寒變症百脈一宗悉致其病也 百脈一宗乃肺病也故金匱用百合	治之其狀欲食復不能食默默欲卧復不能卧欲行復不能行飲食或有美時或有惡聞食臭時如寒無寒如熱	無熱小便赤藥入口即吐如有神靈者	刺法	古聖人治病之法針灸為先靈素所論皆為針灸而	設即治傷寒亦皆用針刺熱病篇所載是也至仲景
----	-------------------	-----------------------------------	--	--------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------	----	----------------------	----------------------



專以湯劑治傷寒尤為變化神妙然亦有湯劑所必
不能愈而必用刺者仲景亦不能舍此而為治後人
豈可不知故另考明諸穴以附於後

尸厥

少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣

反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不

仁此為尸厥當刺期門巨闕

見平脈法

期門二穴在第二肋端不容穴傍各一寸五分上直

欽定四庫全書

傷寒類方

兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之刺入四分灸

五壯肝募也

巨闕一穴在鳩尾下一寸任脈氣所發刺入六分留

七呼灸五壯心募也

傷寒腹滿譫語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺

期門

縱者剋其所勝
放縱不收也

傷寒發熱噦噦惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小

便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

橫者犯其所不勝橫



逆犯上也刺期門皆所以 洩肝之盛氣期門穴見前	太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞 鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則 譫語脈弦五六日譫語不止刺期門	大椎一穴在第一椎陷者中三陽督脈之會刺入五 分灸九壯	肺俞二穴在第三椎下兩旁各一寸五分刺入三分 留七呼灸三壯	欽定四庫全書 傷寒類方	肝俞二穴在第九椎下兩傍各一寸五分刺三分留 六呼灸三壯	太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞 肝俞慎勿下之	陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期 門隨其熱而瀉之澱然汗出者愈	柴胡 條下	凡治溫病可刺五十九穴
--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	--	----------	------------



內經熱俞五十九頭上五行行五者以越諸陽之熱 逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也 氣衝三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也雲 門髃骨委中髓空此八者以瀉四支之熱也五臟俞 旁五此十者以瀉五臟之熱也凡此五十九穴者皆 熱之左右也	欽定四庫全書 傷寒類方	傷寒類方卷下
--	---------------------------	---------------

